

## **Frivillig vern av skog på privat grunn. To områder på Statskog. Oppstart 01.03.2018. Områdebeskrivelser.**

Siden dette er en oppstartmelding, så er det hovedsakelig en kort oppsummering av naturkvaliteter som presenteres. Det vil bli mer utfyllende opplysninger i en høringsrapport.

### **Honnavasslia naturreservat, utvidelse, Flatanger kommune.**

Dette er et område med boreal regnskog, som utvidelse av et reservat som også har rik sumpskog, generelt noe rike skogtyper og litt rikmyr. Området er i utgangspunktet noe høytliggende for boreal regnskog, men gullprikklav er funnet.

Verneverdi: \*\* - regional. Areal: 620 da.

### **Mefosselva, Flatanger kommune**

Område med boreal regnskog, forekomst av sterkt truede arter som trønderringlav, samt meandrerende elv, innslag av sumpskog og flommarskog. Området grenser nesten til Beingårdsmyra naturreservat og utgjør også en del av et helhetlig landskap. Verneverdi, som naturtype: Svært viktig. Areal: 3054 da.



Sumpskog og flommarskoger langs elva



Mefosselva meandrerer mye, her kantskoger på en rettstreknin

### **Storvatnet, Namdalseid kommune.**

Område med en svært stor lokalitet av boreal regnskog på vest- og sørsiden av Storvatnet, samt landskapsrom rundt Storvatnet. Regnskogen utgjør ei ca 3 – 4 km lang, bratt skogli mellom vatnet og fjellet. Det er også registrert regnskogararter på nordsida av vatnet.

Verneverdi: \*\*, regional. Areal: 7292 da




Fra vestsida (t.v.).



Boreal regnskog nordvest i Storvatnet.

### **Gøllaustjønna-Langdalen, Namdalseid kommune**

Langdalen er et landskapsrom med flere forekomster av boreal regnskog, med i alt 5 lokaliteter. Rundt Gøllaustjønna er det et annet landskapsrom, også med flere naturtyper, herunder høgstaudeskog med kalkinnslag. Området er nesten sammenhengende med Storvatnet. Verneverdi: \*\*, regional. Areal: 4091 da.



Boreal regnskog ved Jonettatjønna (t.v.).



Landskapsrommet ved Gøllaustjønna, overveiende rik høgstaudeskog (t.h).

### **Hjartvikfjellet, Namdalseid kommune**

Området er svært variert med eksponering mot sør, vest, nord og øst, og går fra sjøen og i til snaufjell, med både med rike og fattige naturtyper. Området er til dels svært bratt. I alt er det registrert i alt 11 naturtypeområder, bl.a med boreal regnskog, høgstaudeskog – bl.a. med kalkinnslag, samt andre rike skogtyper som høgstaudebjørkeskog og innslag av alm. I de høyereliggende deler er det innslag av svært gammel furu. Verneverdi: \*\*, regional. Areal: 4487 da.



Utsikt mot deler av vestsida langs Statlandsvatnet



Område med boreal regnskog, østsida mot Namsenfjorden

### **Raukamlia, Indre Fosen kommune**

Bratt skråning ned mot Trondheimsfjorden, med grov skog av rik karakter, herunder med kalkinnslag som blåveis. Området ligger i sørboreal sone, og utgjør en del av den samme naturtypen som danner grunnlaget for vernet av Kammen og Kalddalen naturreservat lenger øst. Verneverdi, som en del av den helhetlige naturtypen: \*\*, regional. Areal: 137 da.

### **Husåstjønnbekken, Namdalseid kommune. Statskog.**

Variert område med sumpskog, flommarkskog, meandrerende bekk og elv – herunder med kroksjøer, og område med gammel granskog, og sjeldne arter, verdiklasse A. Taigabendellav, kritisk truet, er funnet i området tidligere, men er ikke bekreftet registrert etterpå. Verneverdi: \*\*, regional. Areal: 629 da.



Flommarkskog og sumpskog

### **Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa kommune**

Liten utvidelse av Finnsåsmarka naturreservat østover, som gir bedre og mer naturlig arrondering i enden av reservatet, og gir mer dybde i område hvor den sjeldne orkideen huldreblom er registrert. Finnsåsmarka er et av de viktigste kalkskogområder i Norge, med svært store forekomster av bl.a. orkideene marisko og flueblom. Finnsåsmarka har nasjonal verdi. Areal, utvidelse: Ca 12 da.



Marisko i Finnsåsmarka (arkivbilde, ikke i utvidelsesområdet)

### **Mariafjellet naturreservat, utvidelse. Statskog. Lierne kommune.**

Området med svært frodig, glissen, storvokst høgstaudegranskog, delvis med kalkinnslag. Området er også kvartærgeologisk spesielt, med en rekke små skarpe ravinedaler i løsmasser ned mot Limingen, ca 11 tallet. Området har betydelige areal med verdifulle naturtyper. Verneverdi \*\*-\*\*\*, regional/nasjonalt. Areal: 9214 da.



Mariafjellet, Limingen statskog: Glissen, grov høgstaudekog, delvis i mange ravinedaler. Høstbilder, tåke

### **Skavlan, Snåsa kommune**

Område i Snåsa med svært gammel og rik skog i den østlige delen, med kalkskogpreg, samt områder med gammel skog, av fukt karakter og mye hengelav. Sentrale deler har stor dekning av viktige naturtyper. Verneverdi: \*\*, regional. Areal: 3272 da.



Rik, svært gammel skog i øst.



Noe sumspskog

### **Skruddudalen Indre Fosen kommune**

Området med ganske høytliggende og til dels svært gammel furuskog med oseanisk preg. Verneverdi \*\*, regional. Areal: 2144 da.



Overveiende et furuskogområde.

### **Vuddudalen, Levanger kommune**

Overveiende svært bratt område ovenfor E6 i Vuddudalen, med gammels skog, rik berggrunn. beliggende i sørboreal sone. Området er også variert i den forstand at i flatere partier er det yngre skog i form av or/bjørk, samt at det i vest er noe almeskog. Området ligger i sørboreal sone, som er prioritert. Området betraktes som et spesialområde. Verdi: \*-\*\*, regional/lokal. Areal: 324 da.




Bratt, gammel skog ovenfor E 6.

### **Henfallet naturreservat, utvidelse. Tydal kommune.**

Området ligger sør for Aune og er en utvidelse nordover av Henfallet naturreservat langs elva Hena i en canyon-preget elvedal med bratte lisider med gammel granskog, stedvis som høgstaudeskog. Den varierte kløftenaturen i området er spesiell og bevaringsverdig, selv om skogen er betydelig påvirket av tidligere bruk.

Verneverdi: \*\*, regional. Areal: 529 dekar.



Fra elvedalen langs Hena. Canyonpreget.

### **Stavåa naturreservat, utvidelse, Rennebu kommune**

Utvidelsen er ei markert bekkekløft østover fra det eksisterende naturreservatet og opp til E6. Området har stor variasjon og mye rik vegetasjon og med viktige bekkekløftkvaliteter. Verneverdi: \*\*, regional. Areal: 126 dekar.



Stavåa sett fra brua over E6. Foto: Tom Hellig Hofton

### **Sjettenberglia naturreservat, utvidelse, Indre Fosen kommune**

Området er en utvidelse av Sjettenberglia naturreservat vestover, og ligger nordøst for Storstvatnet. Området utgjøres i hovedsak av ei bratt sørvendt li med rik vegetasjon i form av høgstaudeskog og lågurtskog av lauv og gran, herunder med noe alm. Deler er kalkskog. Verneverdi \*\*, regional. Areal: 1017 dekar.



Fra brattlia ved Juliuspynten.



### **Vargøyia, Indre Fosen kommune**

Vargøyia ligger like nord for Sjettenberglia naturreservat like øst for Alset i Skaudalen. Området domineres av gammel granskog med noe bjørk, gråor, selje og rogn i et område med varierende topografi. Det er noe rik sumpskog langs Vargøybekken. Litt furuskog finnes oppå åsene/høydene.

Verneverdi \*\*, regional. Areal: 1737 dekar.



Fra Vargøybekken øst for Lona

### **Trongstadlia, Åfjord kommune**

Området ligger langs Ommunddalselva, i en ganske trang elvedal sørøst i Åfjord kommune. Området domineres av granskog, hvorav noe er registrert som boreal regnskog. Det er ganske stort innslag av bjørk, rogn og selje. En gruppe almer finnes i brattlia under Ørnreiret. I sør er det rasmare dominert av lauvskog, med noe gammel rogn, selje og bjørk. Stedvis har skogen preg av lågurtskog med liljekonvall og myske, samt også litt høgstaudeskog.

Verneverdi \*\*, regional. Areal: 722 dekar.



### **Storvika naturreservat, utvidelse, Selbu kommune**

Området ligger vest for Storvika naturreservat og utgjør ei bratt sørvendt li ned mot Selbusjøen i sørboreal vegetasjonssone. Området er kalkskog med rik, godt beitet lågurtskog med artsrik karplanteflora og soppflora. Gran er vanligste treslag, men noe gråor-heggeskog inngår, samt noe furu, osp, selje og hassel. Verneverdi: \*\*, regional. Areal: 77 dekar.



Lia nedenfor Varmdal gård ned til Selbusjøen inngår i området. Foto: Jon T. Klepsland