

**Fylkesmannen i Møre og Romsdal - miljøvernnavdelinga**

Utkast til

**Verneplan for edellauvskog  
i Møre og Romsdal fylke**

**Rapport nr 10 - 1992**

ISBN 82-7430-049-1

ISSN 0801-9363

<b>TITTEL:</b> Utkast til verneplan for edellauvskog i Møre og Romsdal fylke	<b>DATO:</b> 1. mai 1993
<b>SAKSBEHANDLAR/FORFATTAR:</b> Konsulent Odd-Arild Bugge	<b>TAL PÅ SIDER:</b> 118

**SAMANDRAG:**

160 lokalitetar med edellauvskog, det vil si varmekjær lauvskog med alm, hassel, eik, mm., er registrert i Møre og Romsdal. 32 lokalitetar blir foreslått verna som naturreservat i denne rapporten.

Det er eller vert utarbeidd tilsvarande verneplaner i alle fylke. Kvart område er innteikna med vernegrense på kart i målestokk 1:5000, og det er utarbeidd konkrete forslag til verneregler for alle lokalitetane. Kart i full målestokk og verneregler er sendt grunneigarar, lokale styresmakter og andre interesserte.

Rapporten vert sendt alle partar til fråsegn. Endeleg avgjerd om vern vert lagt fram som Kongeleg resolusjon.

## **Forord**

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har etter oppmøding frå Miljøverndepartementet utarbeidd dette utkastet til verneplan for edellauvskogsområde.

Planarbeidet tok til med naturfaglege registreringar i 1974, og sjølv verneplanarbeidet tok til i 1987. Utkastet byggjer på eit omfattande registreringsmateriale, frå ulike kilder. Vel 160 einskildlokalitetar er nærmare vurdert.

I samband med utarbeidninga av verneplanen, er det gjennomført ei rekke synfaringar, og det er halde orienteringsmøte for grunneigarar og lokale styresmakter i alle dei foreslårte områda. Det har kome innspel frå einskildpersonar, grunneigarar, næringsorganisasjonar og offentlege styresmakter frå ulike forvaltningsnivå og sektorar. Alle innspela er vurdert i høve til verneformålet, og ligg til grunn for utvalet av område som no vert foreslått verna. Også den arealmessig avgrensinga og innhald i vernereglane er vurdert utifrå dei innspela kom inn.

Konsulent Odd-Arild Bugge har i samråd med naturforvaltar Harald Ørsahl stått for arbeidet og skreve plandokumentet. Fleire tilsette ved Miljøvernnavdelinga har delteke i arbeidet med synfaringar og registreringar, innhenting av grunneigarlister og utarbeiding og utsending av informasjonsmateriell. Ein særleg takk til konsulent Kirsti Moe Oterhals for hjelp til gjennomføring av orienteringsmøta for grunneigarane sommaren 1991, og til John Bjarne Jordal som har synfart ein stor del av lokalitetane. Takk også for viktige faglege innspel frå Alv Ottar Folkestad og Jarle Inge Holten, samt ei rad andre i det norske fagbotaniske miljøet.

Kostnadene ved utarbeiding av verneplanen er dekt over Miljøverndepartementets budsjett, dels på budsjettkapittel under Direktoratet for naturforvaltning, dels Miljøvernnavdelingas eigne budsjettkapittel.

Molde, mai 1993

*Alv Jakob Fostervoll*

*Odd Högset*  
fylkesmiljøvernsjef

FORORD .....	2
INNLEIING .....	5
EDELLAUVSKOG - EIT MANGFALDIG ØKOSYSTEM .....	5
LAUVSKOGEN I KULTURHISTORISK PERSPEKTIV .....	6
VERDIEN AV URØRT SKOG .....	7
KVA ER EDELLAUVSKOG? .....	8
EDLE TRESLAG OG ANDRE VARMEKJÆRE PLANTER .....	8
HISTORIKK - INNVANDRINGSHistorIE .....	9
EDELLAUVSKOGSTYPANE I MØRE OG ROMSDAL .....	9
VERNEPLAN FOR EDELLAUVSKOG I MØRE OG ROMSDAL .....	13
BAKGRUNN FOR VERNEPLANARBEIDET .....	13
MÅLSETTING OG METODER .....	13
VURDERING AV VERNEVERDI - PRIORITERING .....	14
GEOGRAFISK FORDeling AV EDELLAUVSKOGS-LOKALITETANE .....	15
PRIORITERTE EDELLAUVSKOGSLOKALITETER .....	19
1 HAVÅG Ulstein kommune .....	22
2 EIksUND-ALMSTRAND Ulstein og Hareid kommunar .....	24
3 BERKNES Volda kommune .....	26
4 LEKNES Ørsta kommune .....	28
5 GJEVENESSTRANDA Ørsta og Sykkylven .....	30
6 KVAMSEELVA Ørsta kommune .....	32
7 SJØHOLT Ørskog kommune .....	34
8 MULDALSLIA Norddal kommune .....	36
9 HYSKET Stranda kommune .....	38
10 NESPLASSEN Stordal kommune .....	40
11 SULESUND Sula kommune .....	42
12 RAUDNESVIKA Sula kommune .....	44
13 GRYTAHATLEN Haram kommune .....	46
14 MYSKJEURDENE Haram kommune .....	48
15 SLETTSVAET Rauma kommune .....	50
16 MJØLVA Rauma kommune .....	52
17 UNHJEMSLIA Rauma kommune .....	54
18 STAKKENGFONNA Nesset kommune .....	56
19 JUTNESET-ASALHAMMAREN Nesset kommune .....	58
20 ØVRE VIKE Nesset kommune .....	60
21 HAGSET Midsund kommune .....	62
22 RAUSANDBERGET Averøy kommune .....	64
23 BOKSASPA Tingvoll kommune .....	66
24 EIKREM Tingvoll kommune .....	68
25 KANSDAL-VULVIK Tingvoll kommune .....	70
26 KNUTSLIØYAN Sunndal kommune .....	72
27 OPDØLSTRANDA-SANDVIKDALEN Sunndal .....	74
28 SMÅVOLL Sunndal og Oppdal kommunar .....	76
29 OTTEM Sunndal kommune .....	78
30 KALSET-KUVIKA Surnadal kommune .....	80
31 BRØSKE Surnadal kommune .....	82
32 SVORKALIA Surnadal og Rindal kommunar .....	84
33 TODALSSETTRA Aure kommune .....	86
ANDRE EDELLAUVSKOGSLOKALITETAR SOM ER UNDERSØKT .....	88
KVA INNEBER VERN? .....	111
LOVHEIMEL .....	111
FORSLAG TIL GENERELLE VERNEREGLAR .....	112
SAKSBEHANDLING OG FORVALTNING .....	114
FORKLARING AV EIN DEL ORD OG UTTRYKK .....	116
LITTERATURLISTE .....	117



## INNLEIING

For 15.000-20.000 år sidan var nesten heile Skandinavia dekt av is. Berre nokre få plante- og dyrearter kan kanskje ha overlevd den siste istida ytst ved kysten eller på dei høgste fjelltoppane. Etter kvart drog isen seg attende og planter og dyr byrja å vandre inn frå dei kringliggande områda. Ulike planteartar fann tilfredsstillande levevilkår i forskjellige område, avhengig av sine krav til samansetting av jordbotnen og klimaet. På denne måten blei det dannaa lauv- og barskogar, myrar og heier. Fugle- og dyreartar hadde ulike krav til terreng og vegetasjon i dei områda dei skulle leve i. Dyrelivet varierer derfor i takt med variasjonen i vegetasjon og naturtilhøve elles.

I fleire tusen år levde menneska her i landet i og av naturen utan at dei gjennomførte større, uomgjerlege endringar i landskapsbiletet, eller av plante- og dyrelivet. Etter kvart blei ein del område dyrka opp eller nedbygd, men inngrepa i naturen var framleis heller små. Den tekniske utviklinga dei siste hundre åra har imidlertid gitt vår generasjon nesten uavgrensa høve til totalt å omforme landskapsbiletet og til å gjere store og ubøtande naturinngrep. Dette kan få skjebnesvangre følger for ei lang rekke plante- og dyreartar. Dei artane som er knytt til sjeldne naturtypar vil vere serleg utsette, men også andre artar vil kunne få leveområda sine sterkt nedskorne.

Samstundes som den tekniske utviklinga har gitt oss auka materiell velstand, har den og ført med seg store omveltingar naturmiljøet. I formålsparagrafen i naturvernlova av 19. juni 1970 heiter det derfor:

*"Naturen er en nasjonalverdi som må vernes. Naturvern er å disponere*

*naturressursene ut frå hensynet til den nære samhørighet mellom mennesket og naturen, og til at naturens kvalitet skal bevares for fremtiden. En hver skal vise hensyn og varsomhet i omgang med naturen. Inngrep i naturen bør bare foretas ut frå en langsiktig og allsidig ressursdisponering som tar hensyn til at naturen i fremtiden bevares som grunnlag for menneskenes virksomhet, helse og trivsel."*

I samsvar med dette vil det no i all fysisk planlegging måtte setjast etter måten klare krav om at det skal takas naturvernmessige omsyn. Dette er naudsynt både for å bevare spesielle naturtypar og for å gje planlegginga ei breidd som tek rimelege omsyn til dei langsiktige perspektiva i naturressursforvaltinga som naturvernlova føreset.

Det er enkelte naturtypar som det i dag er serleg stort press på. Det er eit tilsvarande behov for å få ei oversikt over kor store ressursar vi har av desse naturtypane og for å finne ut korleis ressursane best kan forvaltast for framtida. Blant desse naturtypane er våre edellauvskogområde.

## EDELLAUVKOG - EIT MANGFALDIG ØKOSYSTEM

Før mennesket tok til med åkerdyrkning var storparten av Europa og store delar av Sør-Norge dekt av frodige lauvskogar med eit dyreliv som dels er ukjent for dagens menneske. I dag har vi svært lite igjen av desse skogane. Klimaendringer er noko av årsaken til dette, men utviklinga av vår kultur må bere det største ansvaret.

Veidemannen fann tidlig ut at dyrking av åkerland ga betre levekår enn jakt, fiske og sanking av bær og frukter. Dyrking av

skogområda i Norge tok til alt for 4 000 - 5 000 år sidan, og lauvskogsområda var dei mest fruktbare. Lauvskogen, og det dyre- og planteliv som var avhengig av denne skogen, måtte vike for oss menneske.

Vi kan ikkje byte bort moderne landbruk med skogar som på ingen måte kan gi same avling. Men vi har eit særleg ansvar for at denne naturtypen ikkje vert utsletta.

## **LAUVSKOGEN I KULTURHISTORISK PERSPEKTIV**

Frå dei første menneske fann eit næringsgrunnlag i Norge, har dei på ulike måtar utnytta skogen som ressurs for seg sjøl, for levemåte og livberging, for mat og til reiskaper, for jakt, jordbruk og fiske. Måten dei nyttar skogen på har endra seg gjennom tidene, ulikt i ulike landsdelar, og ikkje minst etter kva slags treslag dei fann.

I Norge er gardsbruksdriftseininga som var basis for ei mangesidig utnytting av naturressursane. Skogen materiale som måtte til for å lage reiskaper og verktøy på gardane. For landbruksdrift var skogen særleg viktig, men også fiskarar og fiskarbønder nyttar trevirke til reiskaper og båtar.

Vi har enno inga samla kjennskap til korleis folk på ulike stader valde ut treslag til ulike bruksområde, og korleis dei vurderte treslaga sine eigenskaper. Mykje av denne kunnskapen finn vi enno hos eldre menneske, og det hastar med å dokumentere dette. Her følgjer nokre gløtt inn i kunnskapskista om bruk og utnytting av lauvskogen:

I det gamle husdyrhaldet kom ein vesentleg del av vinterforet frå lauvskogen. Så seint som i matrikkelrevisjonen frå 1860-åra var lauv og lauvskog ført opp som ein viktig økonomisk "herlegheit" dei fleste stader i landet, men særleg på Vestlandet. Mange kom seg gjennom vårnipa ved å

bruke lauv og bork, "skav" av ulike lauvtre. Frå Innfjorden fortalte ei gardkjerring at ho kvar sommar sanka lauv av både bjørk, rogn, hegg og ore. Det beste var orelauvet! Ein sommar sanka dei på garden Demdal tilsaman 1200 lauvkjerv. I bygder med hassel var det treslaget også mykje brukt som fortilek. Synlege spor etter lauvsankinga kan vi sjå i form av såkalla "lauvnavar" tre i skogen. Dette var tre kor garden systematisk hogg 2-3 år gamle skot av trea over lang tid. Borken vart og utnytta som "skav", helst av bjørk, rogn og ikkje minst av alm. I naudsår er det kjent også frå Møre og Romsdal at almebork vart nytta som innblanding i maten til menneske, for å drøye mjølet!

Bork av lauvtre vart og nytta til andre formål. Her i fylket var bjørkebork det viktigaste råstoffet for barking av garn, nøter og båtsegl. I område med eik, vart eikebork brukt til garving. Bjørkenever var kjent som eit viktig taktekingsmateriale under torva. Bjørkenevera har både isolerande og vassavstøytande eigenskapar. Det var ikkje tilgang på kokos- eller hampetau på alle gardar. Istaden vart bast frå lind nytta til tauverk. Elles vart unge bjørkeskot nytta til mykje av det vi bruker tau til i dag, i form av vidjer. Lengda varierte etter bruksmåte. Lange, mjuke band for å bunte saman høylass under transport frå utmarksslåttene til garden, kortare som keipband eller hamleband på robåtane, eller som vidjer/vidjeband på hesjer. Den krokvokste "hegda" eller "rephegda" med lang lærreim er eit godt døme på bruk av eit lauvtreemne som surre- eller festeanordning. Ask er kjent som eit godt treslag til å lage ski av.

Bjørka sin store verdi til brensel er vel kjent, og også andre lauvtre vart nytta til ved. Bjørkeoska var høgt skatta for å lage lut til lutfisk! På nokre bjørketre veks ein sopp, knusk eller knott. Han vart bruka til å gjera opp eld. Under krigen med knappe tider på det meste, tok bruken av knott seg

opp igjen, m.a. som drivstoff for bilar. Eldre folk fortel om bruk av fint, tynt bjørkeris istaden for halm i sengane, altså som madrass! Og snart er vel også "sopelimen" av bjørkeris gått i gløyme boka. Dei eldste sopelimene vart surra saman med bjørkevidjer, medan ein i dag nyttar stålstreng.

Også for båtbyggjarane på Vestlandet var bjørka viktig. Ofte var båtstamnen forma av eit krokvakse bjørkeemne. Går vi vidare i maritim lei og tenkjer på båstøa med dei karakteristiske "lunnane" på tvers, så er det ikkje tvil bland gamlekarane om at asp (osp) er beste treslaget til dette. I Møre og Romsdal er det mange grindabygde naust. Denne konstruksjonen treng både langs- og tverrgåande avstivarar, "skråband", og ofte er krokvaksne bjørkeemner nytta. Bjørkenever var vanlig i bruk som garnfløy, men museumsmateriale vitnar om at både rogn- og bjørketre og vart nytta til same formål.

I gamle dagar vart det meste lagra og transportert i tønner. Hasseltre, eller "hatl" var overlegen som emne for bandstaker til tønneband. Men hegg, rogn og selje ga og gode band. I mange fjord- og dalbygder var produksjon av tønneband ei viktig attåtnæring. Bøkkerane i byane var avtakarar for produksjonen. Hasselnøtproduksjonen var og ei viktig attåtnæring i enkelte bygder, med Eikesdal som den mest kjente.

Desse gløtta gir oss eit inntrykk av verdien av lauvskogen for våre forfedre. På avgrensa plass må døma avgrensast. Til utnytting av skogen knytter det seg og hevdvunne bruks og eigedomstilhøve som er kulturhistorisk interessante. I sin tur gir dei oss i ettertid kunnskap. Ikkje berre om arbeidslivet, men også om samfunnstilhøva, om fordelinga av rettar, om samarbeid og sosial organisasjon i gamle dagar. Skogen, og særleg lauvskogen, var ein del av garden sitt økonomiske grunnlag. Den er

og ei kjelde til kunnskap om vår kulturhistorie, om fordeling og bruk av knappe ressursar. Derfor må vi verne om den, og om brukstradisjonar og den kunnskap som er erverva om lauvskogen som ressurs i vår folkekultur.

## **VERDIEN AV URØRT SKOG**

Vi har auka vår kunnskap om lauvskogen sin funksjon i naturen, og lauvskogen sin verdi for menneska. Det er derfor stor semje om å ta vare på edellauvskogen som naturtype. Under følgjer nokre moment som utdyper verneverdien:

1. Norge har verdas nordlegaste utløparar av edellauvskog. Vi har derfor eit internasjonalt ansvar for å sikre desse forekomstane.
2. Det moderne samfunnet har ført til ak-sellererande endringar og omdisponeringar av naturlege økologiske system. Det er derfor særleg viktig at vi kan sikre eit nett av referanseområde mest muleg urørt (naturreservat). På denne måten får vi høve til å registrere dei biologiske endringane som menneskeaktiviteten fører med seg i andre område.
3. Edellauvskog finst berre på lokalitetar med særleg gunstig klima og jordbotn. Ei rad plante- og dyresamfunn finst derfor berre i slike område. I edellauvskog er det såleis sjeldne økologiske system av stor verdi for økologisk forsking.
4. Dyrelivet i edellauvskog skil seg på ulike vis frå dyrelivet i andre skogtypar. Ei av årsakene til dette er den store produksjonen av plantemateriale og lågare dyreartar som t.d. insekter. Edellauvskog er slik viktige leveområde for jaktbart vilt, og fuglefaunaen er rik.
5. Mange plante- og dyreartar er heilt avhengige av dei spesielle levekåra som finst i ulike typar edellauvskog. Fleire artar er i

dag sjeldne og dels truga av utrydding som eit resultat av tilbakegangen av edellauvskog.

6. I våre nordlegaste edellauvskogar har det utvikla seg hardføre treraser (provenienser) som i framtida kan nyttast, og gi auka produksjon av spesielt lauvtrevirke under norske tilhøve.

7. Undervisning på alle skoletrinn har nytte av edellauvskogsområde. Ved fagskular og i høgare utdanning er slike område særleg viktige for undervisning i botanikk, zoologi, jordbotnlære, økologi og forstleg drift av denne typen skog.

8. Edellauvskogen skaper variasjon i landskapet og har slik stor estetisk verdi. Landskap med edellauvskog er derfor særleg attraktivt for friluftsliv.

## KVA ER EDELLAUVSKOG?

Ved ei grov inndeling av vegetasjonen på jorda, finn vi at det aller meste av Norge ligg i den såkalla boreale (nordlege) barskogsona. Denne sona strekkjer seg rundt heile den nordlege halvkula, og hos oss er gran og furu dominerande treslag. Bjørk, osp, rogn og gråor hører også til i denne sona.

Hassel (Lid 1985)

Sommareik (Lid 1985)

I eit belte langs kysten frå svenskegrensa til Trøndelag finst imidlertid innslag av skogtypar som med eit samlenamn kallast edellauvskog. Desse skogtypane har som fellestrekkt at dei er samansett av treslag med høge krav til temperatur i veksttida, og dels har store krav til jordsmønns. I gjennomsnitt krev dei edle treslaga ein middeltemperatur i juni til september på minst 12,5 °C. Til samanlikning krev gran og furu berre omlag 8,4 °C i samme tidsrom. Edellauvtrærne utgjer berre omlag 1% av dei naturlege treslaga i Norge, målt i kubikkmasse.

## EDLE TRESLAG OG ANDRE VARMEKJÆRE PLANTER

Til dei edle treslaga vi har i Norge reknast: Lind (*Tilia cordata*), Alm (*Ulmus glabra*), Hassel (*Corylus avellana*), Spisslønn (*Acer platanoides*), Sommareik (*Quercus robur*), Vintereik (*Quercus petraea*), Bøk (*Fagus sylvatica*), Ask (*Fraxinus excelsior*).

Av desse finn vi alm, hassel og dels ask med relativt god utbreiing i Møre og Romsdal, medan lind og sommareik finst på nokre få lokalitetar på verdas nordlegaste utpostar. Vintereik og bøk finst ikkje naturleg viltveksande her.

I tillegg til desse "klassiske" edellauvtreslaga, er det i landsplanen for edellauvskogsreservat også teke med stabile forekomstar av svartor (*Alnus glutinosa*), samt i nokre tilfelle lokalitetar med gråor (*Alnus incana*) og hegg (*Prunus padus*). I Møre og Romsdal er det fleire stader

edellauvskoger med dominans av platanlønn (*Acer pseudoplatanoides*). Dette treslaget er opprinnelig forvilla, men har no blitt eit av dei vanlege lauvtresлага på eigna lokalitetar i fylket. Søtkirsebær (*Prunus avium*) er og temmeleg vanleg i enkelte typar av edellauvskogar i fylket.

Kristtorn (*Ilex aquifolium*) og barlind (*Taxus baccata*) er to artar som har utbreiing omlag som edellauvskogen. Kristtorn har si norgrense på Nordmøre, medan barlind finst nord til Molde. I tillegg er det ei rad urter, gras og andre planter vi berre finn i edellauvskog.

## HISTORIKK - INNVANDRINGSHISTORIE

Da den siste istida tok slutt for omlag 10 000 år sidan, var landområda nakne og nedskura av isen. Etter kvart kom det særleg hardføre treslag til landet frå sør. Mellom desse var bjørk og fleire vierartar. Klimaet vart gradvis betre, og furua auka si utbreiing.

For omlag 7 500 år sidan fekk vi den første av fleire gunstige klimaperiodar som varte heilt til for 2 500 år sidan. I denne tida var middeltemperaturen for varmaste månad opptil 2 °C høyare enn i dag. Dei lågare delane av landet vart da dekt av edellauvskog, og på Hardangervidda var det furuskog. Dei første edle treslagene som kom var or, alm og lind. For omlag 5 000 år sidan skifta det varme klimaet frå fuktig til tørt, og da kom også eik og ask inn i vår flora.

For 2 500 år sidan fikk vi eit kjølegare klima, og grana kom inn i landet og fortrengte lauvskogen på Austlandet. Også på vestsida av Langfjella vart edellauvskogen trengt attende til dei mest gunstige lokalitetane. Mange av desse bestandane er igjen gått tapt som følge av menneskeleg aktivitet, m.a. oppdyrkning. I dag er det att berre små restar av dei frodige og rike

edellauvskogane frå varmetida. På Vestlandet har dei klart seg best i vanskeleg tilgjengelege og solrike urer og rasmarker.

Dei norske forekomstane av edellauvskog utgjer dei nordlegaste utpostane i verda av denne naturtypen.

## EDELLAUVKOGSTYPANE I MØRE OG ROMSDAL

Alle planteartar har meir eller mindre strenge krav til temperatur, lys, næring og fukt. Når dei naturgitte tilhøva endrer seg gjennom eit landskap, endrer og vegetasjonen seg. I botanikken blir derfor vegetasjonen delt inn i vegetasjonstypar. Edellauvsskogane krev mykje varme, og dels god næringstilgang, og er samansett av planteartar som er ulike frå dei ein t.d. finn i furuskog på skrinn mark eller på open myr.

*Alm (Lid 1985)*

Edellauvkogstypane i Møre og Romsdal syner stor variasjon. I denne verneplanen er typane inndelt etter det systemet som vart lansert gjennom Økoforsk utredning 1987:1 "Enheter for vegetasjonskartlegging i Norge", redigert av Eli Fremstad og Reidar Elven. Dette valet har og farga utvalet av dei artane som er tekne med i lokalitetsskildringane. Ikke

alle artane som er lista opp som varmekjære er berre det, men dei er med og karakteriserer dei ulike skogtypane, og er slik viktig for klassifiseringa av områda.

Skogvegetasjonen er inndelt i 5 hovudgrupper. Gruppe A omfattar bar- og bjørkeskogane på skrinn mark. Gruppe B og C er bar- og bjørkeskogar på meir næringssrik mark. Av desse er Gråor-heggeskog spesielt interessant i edellauvskogs-samanheng, sidan den har mange felles-trekk med enkelte av edellauvskogstypene. Gruppe D er dei eigentlege edel-lauvskogane, medan gruppe E omfattar skog og kratt på sumpig mark.

Inndeling av naturleg vegetasjon i typar (grupper), slik det er gjort her, er eit nyttig hjelpemiddel i ulike samanhenger. Men ein finn vanlegvis ikkje "grenser" i naturen mellom dei ulike typane, og dei førekjem ofte i ulike grader av mosaikkar. I tillegg til ytre kjenneteikn ved eit område som grunntilhøve og vasshushald, nyttar botanikarane spesielle planteartar for å skilje dei ulike typane. Til dømes er myske, sanikel og ramslauk tre artar som berre finst i varmekjær lauvskog og på næringssrik grunn. Desse artane er då skiljeartar mot fattigare vegetasjonstypar som t.d. gråor-heggeskog. Mange av dei registrerte lokalitetane i fylket inneheld fleire ulike vegetasjonstypar.

### C3 Gråor-heggeskog (*Alno incanae-Prunetum padi*)

Rein gråorskog eller blandingsskog med gråor, hegg, bjørk og vierarter i tresjiktet. Ofte hegg, villrips og bringebær i busksjiktet og frodig og tett feltsjikt med urtar og høge bregner. Opptrer på frisk, næringssrik mark langs elver og bekkar og i lier. Finst i midtre og indre fjordstrøk.

Urter som dominerer eller har sitt tyngdepunkt i gråor-heggeskog:

Tyrihjelm (*Aconitum septentrionale*), Kvitveis (*Anemone nemorosa*), Maigull (*Chrysosplenium alternifolium*), Turt (*Cicerbita alpina*), Lerkespore (*Corydalis intermedia*), Mjødurt (*Filipendula ulmaria*), Gullstjerne (*Gagea lutea*), Springfrø (*Impatiens noli-tangere*), Strutseving (*Matteuccia struthiopteris*), Hundekveke (*Rogneria canina*), Skogsvinerot (*Stachys sylvatica*), Skogstjerneblom (*Stellaria nemorum*), Stornesle (*Urtica dioica*), Vendelrot (*Valeriana sambucifolia*), Fjellfiol (*Viola biflora*).

Svartror (øverst) og gråor (Lid 1985)

## D EDELLAUVSKOG

Varmekjær lauvskog på fastmark. Viktige treslag i Møre og Romsdal er sommareik, hassel, alm, ask og lind. Med unntak av nokre av eikeskogane, opptrer edellauv-skog på næringssrik grunn. Feltsjiktet er gras- og urtedominert. Dei rike edellauv-skogane omfattar nokre av dei mest artsrike skogsamfunna, og blir karakterisert ved forekomstar av sørlege planteartar som ikkje veks i andre vegetasjonstypar.

### D1 og D2 Eikeskog (*Populo-Qercetum* og *Melico-Quercetum*)

Eikeskog, som regel åpen med sparsomt busksjikt. Den fattigaste utforminga (D1) har lyng- og mosedominert feltsjikt, på rikare mark (D2) dominerer gras og urter. I Møre og Romsdal finst typen spredd i midtre og ytre fjordstrøk, med verdens nordgrense i Tingvoll på Nordmøre. Bøkeskogane skal og førast hit, men desse finst ikkje i Møre og Romsdal.

#### D4 - D7 Edellauvskog på næringsrik mark

Ein nytter i hovudsak feltsjiktet, urter og gras, for å skilje dei ulike skogtypane. I tabellen under er det sett opp ei oversikt over dei artane som karakteriserer edellauvskog på næringsrik grunn (Fremstad og Elven 1987). Artar som ikkje kan påtreffast i Møre og Romsdal er utelatt frå lista.

##### Treslag:

Hassel (*Corylus avellana*), Søtkirsebær (*Prunus avium*), Barlind (*Taxus baccata*), Lind (*Tilia cordata*), Alm (*Ulmus glabra*), Leddved (*Lonicera xylosteum*).

##### Urter og gras:

Ramslauk (*Allium ursinum*), Lundgrønaks (*Brachypodium sylvaticum*), Skogfaks (*Bromus benekenii*), Bergfaks (*Bromus ramosus*), Lundkarse (*Cardamine impatiens*), Tannrot (*Dentaria bulbifera*), Skogsvingel (*Festuca altissima*), Kjempesvingel (*Festuca gigantea*), Myske (*Galium odoratum*), Svarterteknettapp (*Lathyrus niger*), Skogfredlaus (*Lysimachia nemorum*), Falkbregne (*Polystichum aculeatum*), Junkerbregne (*Polystichum braunii*), Sanikel (*Sanicula europaea*).

#### D4 Alm-lindeskog (*Ulmo-Tilietum*)

Frodig almeskog, busksjikt av hassel og hegg førekjem. Gjerne opent og artsrikt feltsjikt, og ofte rikt våraspekt. Typen finst i sørverdte lier, ofte på skredmark. D4 er mest varmekjær av almeskogstypane. Har si utbreiing i Møre og Romsdal i midtre fjordstrøk på Sunnmøre og med nokre lokalitetar på gunstige område i Romsdal og på Nordmøre.

Karakteristiske artar er lundgrønaks og sanikel, og ramslauk og myske er ofte dominerande i feltsjiktet. Skogfaks, skogstarr, skogsvingel og kjempesvingel har sitt tyngdepunkt i denne typen. Den skil seg frå gråor-almeskog ved at ikkje gråor-heggeskogsartar (C3) utgjer noko dominerande innslag i feltsjiktet.

#### D5 Kusymre-almeskog (*Primulo vulgaris-Ulmetum*)

Frodig almeskog, ofte med busksjikt av hassel. Vi finn og utformingar yst mot kysten mest utan alm, der hasselkratt utgjer "tresjiktet". Ope og artsrikt feltsjikt, og rikt våraspekt med m.a. vårmarihand, jordnøtt og kusymre. Ramslauk dominarar i fuktige utformingar, medan tørre utformingar har mykje skogsvingel og storfrytle. Eføy kan og dominere einskilde lokalitetar heilt sør i fylket. Bergfaks og mellomtrollurt har tyngdepunkt i denne typen. I tillegg er omrent alle artane frå alm-lindeskog (D4) vanlege.

Typen finst i sørhellingar, ofte på rasmark. I Møre og Romsdal er det denne typen som utgjer edellauvskogen i ytre fjordstrøk og langs kysten, og den har truleg si nordgrense i fylket (Averøy/Frei). Vi skil typen frå dei andre edellauvvskogane ved eit markant innslag av kystbundne artar, og få av gråor-heggeskogsartane (C3).

#### **D6 Gråor-almeskog (*Alno-Ulmetum glabrae*)**

Skog av gråor og alm med innslag av selje og bjørk. Ofte busksjikt av hegg og noko rips. Artsrikt feltsjikt dominert av urter og høge bregner. Ikkje noko utprega våraspekt. Typen står på frisk og nærringsrik jord i solrike hellinger, ofte rasmark. I Møre og Romsdal finn vi typen innerst i fjordbotnene og innover dalane, og den overtar for D4 i midtre fjordstrøk på Nordmøre og nordover mot Trøndelag.

Overgangen mellom D4 Alm-lindeskog og D6 Gråor-almeskog er flytande. Avgjerande er mengda av gråor-heggeskogsartar (C3) ein finn i den

aktuelle lokaliteten. Gråor-almeskog kan populært sjåast som ein gråor-heggeskog med eit tresjikt dominert av alm, og med eit markant innslag av varmekjære og krevjande planteartar.

#### **D7 Svartor-askeskog (*Eurhynchio-Fraxinetum*)**

Blandingsskog av gråor/svartor, ask og med innslag av andre lauvtrær. Artsrikt feltsjikt, med mange arter felles med gråor-heggeskog (C3) og gråor-almeskog (D6). Svært velutviklet våraspekt. Typen er vanligst i lier og rasmarker med sigevatn, og i bekkedaler. Vårkål, skogkarse, kystmaigull og jordnøtt er karakteristiske artar.

## **VERNEPLAN FOR EDELLAUVSKOG I MØRE OG ROMSDAL**

### **BAKGRUNN FOR VERNEPLANARBEIDET**

Arbeidet med vern av edellauvskogsområde vart starta av Statens Naturvernråd i 1972. I 1974 vart det gjort ei registrering av vel 50 lokalitetar i Møre og Romsdal (Korsmo 1975). På denne bakrunnen vart det sett igang ei konkret planarbeid med sikte på vern gjennom kontakt med grunneigarane i mange av dei registrerte områda på Nordmøre på slutten av 1970-talet. Av kapasitetsmessige årsaker stogga arbeidet den gongen. Etter dette kom to grundige registreringar av varmekjære lauvskogar på Nordmøre (Holten 1978 og 1979) der 33 lokalitetar vart undersøkt.

Arbeidet med verneplanen starta opp igjen i 1987, da fylkesmannen på eige initiativ gjorde registreringar av edellauvskog i Sunnmørsfjordane (Fylkesmannen i M&R 1988). Sommarane 1988 og 1989 gjorde fylkesmannen ytterligare tilleggsregisteringar for å få eit så godt oversyn over aktuelle lokalitetar som råd. Dette feltarbeidet har i hovudsak vore utført av Odd-Arild Bugge og John Bjarne Jordal, men andre ved miljøvernavdelinga har og gjeve bidrag.

Både under arbeidet på 1970-talet, og no har det vore kontakt mellom miljøvernstyresmaktene og dei regionale skogbruksstyresmaktene for å gi informasjon og få tilbakemelding på aktuelle lokalitetar.

Alle aktuelle edellauvskogsområde til denne verneplanen er i tillegg registrert på fylkesmannens naturatlasserie som er sendt kommunane til orientering.

### **MÅLSETTING OG METODER**

Målsettinga med verneplanarbeidet er å sikre eit representativt utval av dei typane av edellauvskog som er verneverdig i nasjonal eller regional samanheng. Dei fleste av lokalitetane ønsker ein å verne så urørt som råd, og å la dei utvikle seg naturleg. I mange lokalitetar er det imidlertid visse suksesjonssteg, som både kan vere naturlege og kulturbetinga, ein ønsker å verne. Dei siste krev spesielle skjøtselstiltak.

For å nå målsettinga, må dei verna områda vere så store at dei i rimeleg grad fungerer som sjølvstendige økosystem. Det fører med seg at enkelte område også omfattar andre naturtypar enn edellauvskog, der det er nødvendig for å få til ei funksjonell og rasjonell eining. Å berre verne små kjerneområde av dei aller mest typiske lokalitetane vil ikkje sikre målsettinga om mangfold og sjølbæreevne. I verneplanen er det særleg fire lokalitetar som peiker seg ut som store og mangfaldige lokalitetar. Eiksund-Almstrand og Sula Sørvestside er begge kystprega bratte lauvskogslier, medan Oppdølstranda har meir innlandsprega varmekjær flora, særleg i Sandvikdalen. Også Kalsetlia har kvalitetar som gjer det ønskeleg å vurdere vern av eit stort, samanhengande naturområde. I alle desse lokalitetane kan ein sikre samanhengande naturområde frå sjøen til snaufjellet mest utan inngrep, og med store mengder varmekjær og rik vegetasjon.

Ved utvelging av lokalitetar for vern, er flora og vegetasjonstypar nøkkelinformasjon. Alle lokalitetane med høg verneverdi er klassifisert til vegetasjonstype, og dei einskilde verneobjekta er plukka ut innafor dei ulike typane.

Talet på lokalitetar er sett så høgt at vi kan vere rimeleg sikre på at variasjonsbredden på edellauvskog er dekt opp. Med eit slikt utval bør vi ha sikra leveområde også for dei fleste insekts- og småviltartane som er avhengige av edellauvskogsområde, selv om det i denne planen ikkje er gjort eigne registreringar og vurderingar på dette feltet. Nye kunnskaper som kjem til kan føre til trong for utviding av verneplanen for å sikre slike verneverdiar.

## VURDERING AV VERNEVERDI - PRIORITERING

Ved ei samla vurdering av dei registrerte lokalitetane, kan verneverdien fastsetjast utifrå vitenskapelege og andre kriterier. Dei eigenskapene ein har lagt vekt på er:

**1. Om skogtypen er sjeldan**, det vil si at dei vegetasjonssamfunn som utgjer skogtypen har lita utbreiing nasjonalt, eller er i si yttergrense i regionen. Høgst prioritet gis til lokalitetar med fleire godt utvikla edellauvskogstypar, deretter lokalitetar med gode eike-, aske- eller svartorbestand. Alm-hasselskogstypane er relativt vanlege i fylket, og det er fleire alternativ å velge mellom.

**2. Lokalitetens storleik i areal og dimensjonar**, eit stort område med godt utvikla tresjikt er vurdert høgare enn eit mindre. Dette fordi store område til vanleg har større mangfold, og er meir stabilt i høve til ytre påverknad. Fleire lokalitetar er på meir enn 1000 dekar, og desse er høgt prioritert. Men vi har også lokalitetar med spesielle forekomstar, som t.d. eikeskog, på under 10 dekar som er rekna som svært verneverdige.

**3. Skogbestanden sin struktur og utföring**. Ein skog med typisk og godt utvikla vegetasjon, gjerne med storstamma tresjikt, er vurdert høgare enn bestand med glissen eller utypisk utforming. Storstamma, homogen og einsarta edel-

lauvskog er ikkje vanleg i fylket. Dei fleste lokalitetane har preg av blandingslauvskog, og dei kystprega hasselkratta har ofte ikkje noko godt utvikla tresjikt i det heile.

**4. Lokalitetens verdi som miljø for sjeldne arter**, både planter og dyr. Der det er registrert spesielle sjeldne planter, dyr eller insekter, er verneverdien sett høgt. Som ein ledetråd har dei lokalitetane som har minst tre av karakterartane for den boreonemoriale vegetasjonsregionen fått høgste karakteren for dette kriteriet.

**5. Graden av kulturpåverknad**. Dette er eit tvetydig vurderingskriterium. Granplanting i eit bestand trekker verneverdien ned i alle tilfelle, då gran er rekna som eit framand og uønska treslag i edellauvskogsreservat. Lauvingstre, t.d. av alm, kan imidlertid i visse lokalitetar gi auka verneverdi dersom ein legg vekt på å sikre eit kulturhistorisk skogbilete. Høgaste verdi har dei lokalitetane som er urørte av granplanting og tekniske inngrep, medan tidlegare tiders bruk til lauving, ved og anna utnytting er vurdert spesielt for dei lokalitetane som er aktuelle.

**6. Om det er mogleg å knyte edellauvskogsbestanden til andre verna eller verneverdige område**. Der ein kan samle fleire verneområde med ulike verneformål, får einskildlokalitetane høgare verneverdi.

Mange andre kriterier for vurdering av verneverdi har vore nytta for å prioritere naturforekomstar i høve til kvarandere.

Kulturhistoriske verdiar kan nyttast t.d. i Eiksdalen for å sikre eksempel på den intensive utnyttinga av hasselskogen fram til 1950- åra.

Lokalitetane sin verdi for andre organismer, både insekt, fuglar og dyr, kan og trekkast inn. Ved at ein sikrer eit godt utval av tilstrekkeleg storleik, vil ein

samstundes sikre vesentlege leveområde for t.d. for insekt og småfuglar som er særskilt knytta til edellauvskogar. Men det er ikkje gjort særskilde vurderingar av dette i samband med denne verneplanen.

Det er heller ikkje særskild teke omsyn til områda sin verdi for forsking, undervisning og rekreasjon. Dette er vurderingskriterier som for ein stor del avhenger av tilgjenge og nærleik til busetnad. Nokre av lokalitetane ligg slik til at dei er godt eigna, medan andre er lite tilgjengelege. Nokre av lokalitetane er såkalla klassiske botaniske lokalitetar som har vore nytta i forskings- og undervisningssamanheng på høgkulenivå i fleire ti-år.

Alle dei registrerte edellauvskogslokalitetane i Møre og Romsdal er vurdert utifrå desse 6 kriteriene, og gitt ein verneverdi:

- 1. Nasjonalt verneverdig**
- 2. Regionalt verneverdig**
- 3. Lokalt verneverdig**

Dei fleste lokalitetane med verneverdi 1 er tekne med i verneplanutkastet. Det er nokre lokalitetar med prioritet 1 som det finst betre alternativ til i nærleiken, som t.d. i Geirangerfjorden og Eikesdalen. I tillegg er nokre lokalitetar med verdi 2 tekne med for å nå målsettinga med å sikre eit representativt utval av edellauvskogstypane.

Dei lokalitetane med verdi 2 som ikkje er foreslått verna, samt dei lokalt verneverdige lokalitetane, bør sikrast gjennom den kommunale arealplanlegginga. Fylkesmannen har gjeve ut ein eigen rapport der alle dei registrerte

edellauvskogslokalitetane er nærmere skildra og avgrensa på kart.

## **GEOGRAFISK FORDELING AV EDELLAUVSKOGS-LOKALITETANE**

### **VEGETASJONSREGIONAR**

Norge kan delast inn i regionar utifrå botaniske kriterier, hovudsakleg etter utbreiinga av planteartar og -samfunn.

Fordelinga av vegetasjonen er i store trekk klimaavhengig. I nasjonal samanheng varierer vegetasjonen sterkt frå sør til nord, frå lågland til fjell, og frå vest til aust (kyst/innland). Dei ytste kyststroka er så forskjellige frå vegetasjonen elles, at det er skilt ut ein eigen kystseksjon. Dei øvrige vegetasjonsregionane avspeglar i hovedtrekk vegetasjonen sine krav til sommarvarme. For Boreo-Nemoral og Sør-Boreal region har og vegetasjonen krav til vintertemperaturen.

**Kystseksjonen:** Lynghei og myr, ofte med røsslyng, dominarar, sparsomt med skog. Omfattar ytre kyststrøk frå Sørlandet til

*Skjematisk fordeling av almeskogstypar i fylket*

Lofoten. Kystseksjonen syner stor likskap med llynghiområda i dei andre Nordsjølanda. Karakteristisk for kystseksjonen er høg vintertemperatur (lågaste månadsmiddel ligg over 0 grader). Hasselkratt, dels med alm eller eik, finst på gunstige lokalitetar. Kusymre-almeskog (D5) har si hovudutbreiing i kystseksjonen i Møre og Romsdal.

**Boreo-Nemoral Region (Nordlig edellauv- og barskogssone):** Regionen danner overgangen mellom den varmekrevjande eikeskogsregionen vi finn særleg godt utvikla på Sørlandet, og Barskogsregionen som er arealmessig dominerande av skogsområda i landet. Edellauvskog med eik, lind, ask, alm og hassel og undervegetasjon med varmekjære artar dominerer i solrike lier med godt jordsmonn. Bjørk-, gråor- eller barskog dominerer resten av landskapet. På Vestlandet og nordover til Trøndelag finn vi regionen hovudsakleg som smale striper langs nord- og austsidene av fjordane. Dei aller fleste av dei mest verneverdige edellauvskogslokalitetane i fylket ligg i denne

regionen.

**Sør-Boreal Region (Sørlig barskogsone):** Barskog dominerer, men med oreskog på store areal. På gunstige lokalitetar finst edellauvskogssamfunn med mange varmekrevjande artar. Nokre av edellauvskogslokalitetane med høg verneverdi ligg i denne regionen. Desse ligg hovudsakleg inne i dalføra.

**Mellom-Boreal Region (Midtre barskogsone):** Fattigare barskog og bakkemyrar er typisk. Velutvikla gråorskog rekk opp i denne regionen. Det er ikkje registrert edellauvskog i Mellom-Boreal.

**Nord-Boreal Region (Fjellskogsone):** Bjørkeskog og bakkemyrar dominerer. Omfattar fjellskogen opp mot den klimatiske skoggrensa.

**Alpin Region (Fjellbeltet):** Område over den klimatiske skoggrensa.

## NATURGEOGRAFISKE REGIONAR

Denne inndelinga vart framlagt av Nordisk Ministerråd i 1977. Norden er her inndelt i 60 ulike naturregionar, alle med sitt sær preg i natur og landskap. I Møre og Romsdal er seks av desse regionane representert. Det er to kystregionar (nord og sør), to fjordstrøkregionar (nord og sør) og ein fjellregion. Den sjette kjem såvidt innafor fylkesgrensa i Rindal kommune.

Kystseksjonen (skravert) og boreo-nemoral vegetassjonssone (svart)

**REGION 34:** Bar- og fjellbjørkeskogsområdet nord for Dovre til Vestjemtland, 34a Skogen nord til Hattfjelldal i Nordland:

Vestspissen av denne regionen kjem så vidt innafor fylkesgrensa heilt i nordaust, i Rindal kommune. Ingen edellauvskoglokalitetar er registrert i denne regionen.

**REGION 35:** Fjellregionen, 35e Møretindene:

Størsteparten av denne underregionen ligg i Møre og Romsdal. Fjella er sterkt oppstykka av dalar i forlenginga av fjordar. Fjellsidene er bratte, og toppområda er prega av utallege botnar med og utan brear.

Fjellvegetasjon dominerer, med innslag av bjørkeskog i dalane. Øvre del av Sunndalen ligg i denne regionen, og her er et fleire lokalitetar edellauvskog, med Gjørahaugen og Småvoll som dei beste.

**REGION 37:** Vestlandets lauv- og furuskogsregion, 37f Nordfjord og Sunnmøres fjordstrøk:

Den sørlege delen av underregionen omfattar stort sett Voldsfjorden, Hjørundfjorden og Storfjorden med omliggande fjordlier og dalar. Nord for Storfjorden ligg eit dal- og forfjellsområde før Romsdalsfjorden avgrensar regionen mot nord. Sjølve Romsdalen er og rekna med til denne regionen.

Blandingsskog dominerer vegetasjonen i denne regionen. Furu danner sammenhengande skogar langt ut mot kysten. I sørvestlige fjordier og i indre deler av fjordene er det store arealer med edellauvskog.

**REGION 38:** Den vest-norske lyngheiregion: 38c Nordvestkysten:

Den mest typiske landskapsforma er strandflata, ein brem av lågt terreng nedanfor bratte fjell. Lyngmark med innvandring av bjørk på tidlegare kulturmark dominerer vegetasjonen. Edellauvskog finst berre fragmentarisk utvikla som hasselkrott i sørhellinger. Regionen omfattar i hovudsak den sørlege delen av kystseksjonen i fylket.

**REGION 39:** Møre og Trøndelags kystskogregion: 39a Møre- og Sør-Trøndelagstypen:

Fjordane med omliggande fjell og åsparti utgjer størsteparten av denne underregionen. Sørlege og indre delar liknar på landskapsformene i region 37, med U-dalar og bratte fjordlier. Utover mot kysten, og nordover i fylket blir fjella lågare, og fjella får meir plattaform. Furu- og bjørkeskog er dominerande. I sørhellinger og inne i lune fjordarmer er det temmeleg store alm-hasselkoger. Eika har si nordgrense på Tingvollhalvøya.

**REGION 40:** Møre og Trøndelags kystregion:

Ytst ligg fleire øyar med låglands karakter (Aukra og Smøla, samt dei flate landområda innafor Bud). Markert overgang til høgare fjell- og åsparti. Lyng- og myrvegetasjon dominerer, og relativt store areal har bjørke- og furuskog. I lune sørhellinger finst alm- og hasselskoger. Regionen omfattar i hovudsak den nordlege delen av kystseksjonen i fylket.

## SAMLA VURDERING

I dette verneplanutkastet er det foreslått verna 33 edellauvskogslokalitetar. For å kunne vurdere kor representativt dette utvalet er for naturvariasjonen i Møre og Romsdal, er lokalitetane vurdert utifrå både vegetasjonsregionar og naturgeografiske regionar.

Som venta ligg dei aller fleste lokalitetane i den boreo-nemorale vegetasjonsregionen, noko som er innlysande all tid denne regionen nettopp er karakterisert ved forekomsten av edellauvskog. Men nokre få lokalitetar har vi og i kystseksjonen og i den sør-boreale regionen. Slik er fordelinga tilfredsstillande i høve til vegetasjonsregionane.

Den same fordelinga finn vi også når det gjeld dei naturgeografiske regionane, som og i stor grad er avgrensa utifrå botaniske tilhøve. Dei aller fleste edellauvskogslokalitetane ligg i dei to fjordregionane, og nokre få ligg i de to kystregionane. Fordelinga nord-sør mellom regionane er rimeleg god, med ei lita overvekt i talet på lokalitetar i den sørlege fjordregionen.

## PRIORITERTE EDELLAUVKOGSLOKALITETER

<b>Lokalitet</b>	<b>Areal dekar</b>	<b>Skogtype(r)</b>	<b>Prioritet</b>
1 HAVÅG	8	D2 D1	2
2 EIKSUND-ALMSTRAND	4488	D5	1*
3 BERKNES	67	D7 (D5)	1
4 LEKNES	461	D2 (D4)	1-2
5 GJEVENESSTRANDA	2378	D4	2
6 KVAMSEELVA	729	D6 C3	2
7 SJØHOLT	422	D4 D7b	1
8 MULDALSLIA	606	D4 D6	1*
9 HYSKET	338	D4 D6 C3	1
10 NESPLASSEN	461	D4fe D7	1
11 SULESUND	432	D7b	1
12 RAUDNESVIKA	2108	D5	1
13 GRYTAHATLEN	97	D5qr/D2	2
14 MYSKJEURDENE	63	D5	2
15 SLETTSVAET	1235	D6	2
16 MJØLVA	128	D6fe	1
17 UNHJEMSLIA	645	D4	2
18 STAKKENGONNA	465	D6	2
19 JUTNESET-ASALHAMMAREN	2035	D6	1
20 ØVRE VIKE	-	D6	1-2
21 HAGSET	217	D5 (D7)	1
22 RAUSANDBERGET	251	D5	1-2
23 BOKSASPA	17	D2 D1	1*
24 EIKREM	90	D	2
25 KANSDAL-VULVIK	647	D4	1
26 KNUTSLIØYAN	140	C3 (D6)	2
27 OPDØLSTRANDA-SANDVIKDALEN	3990	D6 D4	1*
28 SMÅVOLL	378	D6	2
29 OTTEM	1660	C3	1-2
30 KALSET-KUVIKA	2576	D6 (D4)	1
31 BRØSKE	86	D4 (D6)	1
32 SVORKALIA	225	D6	2

<u>33 TODALSETRA</u>	299	D6	2
Areal ialt	27308	dekar	

\* desse lokalitetane er særleg verfulle også i internasjonal målestokk

**KARTOVERSIKT, FORESLÅTTE VERNEOMRÅDE:**



## **1 HAVÅG Ulstein kommune**

Kartreferanse	M711:	1119 I LQ 380 065
Areal i dekar:	8	
Høgde over havet:	0-25 meter	
Gards- og bruksnummer:	73/8	

### **OMRÅDESKILDRING**

Eikeskog i sørvestvendt berghammer mellom riksvegen og sjøen, like vest for ferjeleiet i Eiksund. Avgrensa av riksvegen i nord, som går i ei djup skjæring. Mot sør grenser lokaliteten mot sjøen, i aust mot krattskog og to hytter, og mot vest er det dyrka mark inntil skogen. Det er elles mykje eik i kulturlandskapet frå Havåg mot Eiksund.

### **FAGLEG VURDERING**

Sommareik er dominerande treslag, med innslag av bjørk, osp, søtkirsebær, hegg og hassel i tresjiktet. Mellomtype mellom fattig blåbærtyppe og rikare lågurttyppe. Frå artsutvalet kan nemnast kusymre, vivendel, kvitveis, liljekonvall, krattlodnegras, hengeaks, lundrapp, krattmjølke, jordnøtt og gulflatbelg.

### **FORMÅLET MED VERNEFORSLAGET**

Formålet med verneforslaget er å sikre restene av det største homogene eikebestandet i Møre og Romsdal. Vern av eik kan eventuelt tilleggssikrast gjennom artsfreding utanom den aktuelle lokaliteten.

### **UTFØRTE INNGREP**

Delar av lokaliteten vart øydelagd av vegskjeringa når riksvegen vart lagd om. I strandkanten ligg ei hytte, utan at den har påført skogen vesentleg skade.

### **KJENDE INTERESSEKONFLIKTER**

Ingen kjende interessekonflikter.

### **AKTUELLE SKJØTSELSTILTAK / MERKNADER**

Nokre granplanter bør fjernast.

### **KJELDER:**

Korsmo 1978, Bugge 1989



## 2 EIKSUND-ALMSTRAND Ulstein og Hareid kommunar

Kartreferanse M711: 1119 I LQ 407 084  
Areal i dekar: 4488  
Høgde over havet: 0-697  
Gards- og bruksnummer: Ulstein: 15/3 17/1-6 18/1-6 69/1-4 70/1-7 Hareid: 63/1-4

### OMRÅDESKILDRING

Stor søraustvendt, bratt lauvskogsli som vender mot Vartdalsfjorden. Lia er av dei største urørte vi har i ytre delar av fylket. Skogen strekker seg fra sjøen og opp mot 400 meter, medan høgste toppane går godt over 600 meter. Ved kommunegrensa stikk Laupsneset ut, og gir eit markant skilje mellom to delområde. Den rikaste floraen finn ein i den sørlege delen, medan bjørka dominerer nord for neset. Også fjellområda over lia er botanisk interessante, godt utvikla og intakt heivegetasjon.

### FAGLEG VURDERING

Kystprega søraustvendt lauvskogsli med stor variasjon i skogtypar, og med eit stort mangfald av krevjande planteartar. Bjørk, hassel, gråor og rogn er dominerande treslag i sørdelanen av lokaliteten, med markante innslag av alm og svartor. Eik er og registrert her, m.a. med eit mindre bestand på Laupsneset. Feltsjiktet er svært rikt og frodig med m.a. lundgrønaks, sanikel, skogstarr, myske, ramslauk, jordnøtt og kusymre i tildels svært store mengder. I tillegg kan nemnast kristtorn, vestlandsvikke, fuglereir og kvit skogfrue som sjeldne artar. Som nemnt er det noko fattigare frå Laupsneset til Alme, med bjørk som dominerande treslag, men det er betydelege innslag av varmekjær og rik vegetasjon også her. I tillegg til dei botaniske verneverdiane, er det og registrert ein svært stor tettleik småfugl og spettar, samt hekkande rovfugl i området. Vinterbeiteområde for hjort.

### FORMÅLET MED VERNEFORSLAGET

Formålet med verneforslaget er å sikre ei av dei meste verdfulle lauvskogsliene i fylket. Uvanleg stort artsmangfald, ei rad sjeldne artar planter og fugl, samt at lia er stor og fri for tekniske inngrep, gjer at denne lokaliteten er vurdert å ha nasjonal/internasjonal verneverdi.

### UTFØRTE INNGREP

Med unntak av ein beskjeden kjerreveg/sti i delar av lia, er ho så godt som urørt.

### KJENDE INTERESSEKONFLIKTER

Ved å trekke grensa unna gardane på Alme, samt unngå Øggardslia og dei bustadnære områda på Gjerde, er det ikkje lenger konkrete interessekonflikter i lokaliteten.

### AKTUELLE SKJØTSELSTILTAK / MERKNADER

Ingen tiltak nødvendig.

### KJELDER

Marker 1977, Folkestad



### **3 BERKNES Volda kommune**

Kartreferanse M711: 1119 II LQ 415 038

Areal i dekar: 67

Høgde over havet: 20-270 meter

Gards- og bruksnummer: 2/1,3,4,10

#### **OMRÅDESKILDRING**

Nordvestvendt lauvskogsli på nordsida av Berkneset. Lia ligg frå vegen og opp mot Lidaveten. Lokaliteten er svært frisk, med sigevatn og oppkome som gir vatn sjøl i tørre periodar. Svartor er dominerande treslag, med innslag av ei rad andre. På flata mellom lia og vegen er det kraftig gjengroing av unge svartortre, og her vil det etter nokre år kunne bli ein fin tilvekst til skogen i lia.

#### **FAGLEG VURDERING**

Dette er ein av dei best utvikla svartorskogane i fylket, med tett bestand av storvaksne tre. I tillegg er det ein del gråor, samt eit asketre. Skogtypen ligg plantesosiologisk mellom oraskeskog og kusymre-almeskog. Varmekjære artar; ormtelg, jordnøtt, kusymre og krattmjølke, i tillegg ei rad gråorskogsartar som kvitveis, krypsoleie, enghumleblom, vendelrot, mjødurt, sumphaukeskjegg, trollurt, bringebær, turt, skogburkne, gauksyre, myrmaure og sløkje. Andre interessante artar er krattlodnegras, bekkekarse, grøftesoleie, gulsildre og stjernesildre. Vinterbeiteområde for hjort.

#### **FORMÅLET MED VERNEFORSLAGET**

Formålet med verneforslaget er å sikre ein av dei best utvikla svartorskogslokalitetane i fylket. Denne skogtypen er relativt sjeldan i god utforming.

#### **UTFØRTE INNGREP**

Ein brønn til vassuttak og andre mindre spor etter bruk, men ingen tekniske inngrep som vesentleg reduserer verneverdien.

#### **KJENDE INTERESSEKONFLIKTER**

Ingen

#### **AKTUELLE SKJØTSELSTILTAK/MERKNADER**

Ingen

#### **KJELDER:**

Bugge og Jordal 1988



## **4 LEKNES Ørsta kommune**

Kartreferanse	M711:	1219 III LQ 728 001
Areal i dekar:	461	
Høgde over havet:	10-510 meter	
Gards- og bruksnummer:	118/1,2 119/1-5	

### **OMRÅDESKILDRING**

Stort åsdrag på Nordsida av Norangsfjorden, ut mot Hjørundfjorden. Sør vendt, tørr skogsli ovafor vegen til Leknes ferjekai. Markert innslag av eik og hassel, elles dominerer andre lauvtre som bjørk og osp, samt noko furu. Skogen er broten opp av steinurder, og dei rikare partia er oppdelte av skrinne parti med lyngmark.

### **FAGLEG VURDERING**

Lokaliteten er botanisk svært interessant, da ein her finn ein større lokalitet med eit stort innslag av eik utan større tekniske inngrep. I tillegg er det ei rad varmekjære artar i feltsjiktet, noko som manglar i dei andre eikelokalitetane i fylket. Alm er ikkje registrert i lokaliteten. Feltsjiktet har eit klart kystpreg. Delar av lokaliteten kan klassifiserast som lågurt-eikeskog. Varmekjære artar; lundgrønaks, myske, sanikel, skogfaks, kusymre, kratthumleblom, firblad, ramslauk, vårmarihand, samt jordnøtt, breiflangre, vanleg nattfiol, krattmjølke, trollurt, brunrot, fagerperikum og fuglereir. Mange av indikatorartane på rikare eikeskog er representert, som hengeaks, stormarimjelle, gullris, engkvein, liljekonvall, tågebær, markjordbær og skogfiol. Vinterbeiteområde for hjort.

### **FORMÅLET MED VERNEFORSLAGET**

Formålet med verneforslaget er å sikre den botanisk rikaste eikeskogslokaliteten i fylket. Floraen er fullt på høgde med mange av almeskogane i fylket. Slik som situasjonen er no, med kraftig beiting av geit, er det høgst uvisst korleis vegetasjonen vil utvikle seg. Kraftig beiting av geit er i utgangspunktet ikkje ønskeleg i naturreservat av denne typen. Det er imidlertid av stor vitenskapeleg interesse å sjå korleis florabiletet vil endre seg etter som skogen vert tynna ut, og kanskje forsvinn heilt i delar av lia. Slik er eit studie av endra naturlilhøve som følgje av geitebeiting eit av verneformåla med denne lokaliteten.

### **UTFØRTE INNGREP**

Det går ei kraftline gjennom nedre delen av lia, der det og går ein veg. Noko gran er planta inntil lokaliteten. Det er nyleg slept vesentleg fleire geiter på beite i området, og delar av skogen er så hardt beita at mange tre, særleg hassel, vil døy. Kva som vil skje med skogen, og særleg eiketrærne og det rike feltsjiktet, er svært usikkert.

### **KJENDE INTERESSEKONFLIKTER**

Dersom geitebeitinga kan halde fram, er det ikkje konflikter i området.

### **AKTUELLE SKJØTSELSTILTAK/MERKNADER**

Det er lite aktuelt å stanse geitedrifta i området. Utviklinga bør derfor vurderast fortløpende, slik at ein eventuelt kan fremme eit verneforslag seinare.

**KJELDER:** Bugge og Jordal 1988, Bugge 1991



## **5 GJEVENESSTRANDA Ørsta og Sykkylven**

Kartreferanse M711:	1219 IV LQ 670 155
Areal i dekar:	2378
Høgde over havet:	0 - 834 meter
Gards- og bruksnummer:	Ørsta: 111/1,2 Sykkylven: 57/1-5

### **OMRÅDESKILDRING**

Vestvendt stor lauvskogsli ytst i Hjørundfjorden. Bjørk dominerer, men store innslag av hassel i busksjiktet, og fleire gode bestand med alm. Elles hengebjørk, osp og lerk, og det skal vere barlind i lokaliteten. Eit markert avgrensa gråorbestand på rasvifte. Det er ikkje veg fram til denne lokaliteten, men det går ei stor kraftline i nedkant av lia.

### **FAGLEG VURDERING**

Lokaliteten er eit godt døme på dei varmekjære, frodige fjordliene på Sunnmøre, ein skogtype det er vurdert fleire gode lokalitetar av i verneplanen. Plantesosiologisk ligg lokaliteten nær alm-lindeskog. Varmekjære artar; lundgrønaks, myske, sanikel, svartertekapp, vivendel, ormetelg og krattmølke. Elles er storfrytle og kranskonvall registrert. Barlind vart ikkje påvist, men ubekrefta meldingar tyder på at det skal vere barlind i lia.

Vinterbeiteområde for hjort.

### **FORMÅLET MED VERNEFORSLAGET**

Formålet med verneforslaget er å sikre ei av dei rike og nær urørte lauvskogsliene i fjordane på Sunnmøre. I Hjørundfjorden er dette den beste lokaliteten av denne typen.

### **UTFØRTE INNGREP**

Stor kraftline i nedkant av lia mot sjøen. Elles urørt lokalitet.

### **KJENDE INTERESSEKONFLIKTER**

Ingen

### **AKTUELLE SKJØTSELSTILTAK/MERKNADER**

Ingen

### **KJELDER**

Bugge og Folkestad 1988



## **6 KVAMSEELVA Ørsta kommune**

Kartreferanse M711: 1219 III LP 726 914  
Areal i dekar: 729  
Høgde over havet: 0 - 400 meter  
Gards- og bruksnummer: 142/1-5

### **OMRÅDESKILDRING**

Søraustvendt lauvskogsli inst i Hjørundfjorden med store alm-hasselbestand. Elles er det mykje bjørk-hasselkog og i skredrenner står det gråorskog. Det er innslag av selje og rogn. Sør for almeskogen, ved Finnes, står eit uvanleg stort og godt utvikla gråorbestand på omlag 200 dekar.

### **FAGLEG VURDERING**

Lokaliteten er botanisk interessant som ein fjordbotn-type av almeskog, plantesosiologisk nær gråor-almeskog. Varmekjære artar; storklokke, myske, lundgrønaks, kjempesvingel, krattfiol, tannrot, jordnøtt, krattmjølke, lundrapp. Eit stort innslag av gråorskogsartar som t.d. skogsvinerot, kratthumleblom, hundekveke, skogburkne, mjødurt, skogstjerneblom, sløkje og kvitveis. Elles burot, brunrot, gulflatbelg, skjørbuksurt, krossved, krattlodnegras og kransmynte. Gråorskogen i sør er frodig med m.a. rips, hegg, rogn, ormetelg og dei ovarfornemnte gråorskogsartane. Vinterbeiteområde for hjort.

### **FORMÅLET MED VERNEFORSLAGET**

Formålet med verneforslaget er å sikre ein godt utvikla lokalitet med varmekjær gråor-almeskog. Saman med gråorskogen ved Finnes har denne lokaliteten nasjonal verneverdi.

### **UTFØRTE INNGREP**

Det er planta litt gran i området.

### **KJENDE INTERESSEKONFLIKTER**

Grunneigarane meiner det er muleg med kraftutbygging i Kvamseterelva, samt at det kan byggast veg utover lia for tilkomst til eit eventuelt oppdrettsanlegg. Stor rasfare vanskeliggjer desse planane.

### **AKTUELLE SKJØTSELSTILTAK/MERKNADER**

Ingen

### **KJELDER**

Bugge og Folkestad 1988, Løfall 1989



## **7 SJØHOLT Ørskog kommune**

Kartreferanse M711: 1219 I LQ 854 303  
Areal i dekar: 422  
Høgde over havet: 55 - 525 meter  
Gards- og bruksnummer: 104/1-9,13 105/1-4,6

### **OMRÅDESKILDRING**

Stor sørvestlig lauvskogsdel vest for Sjøholt sentrum. Nedre delen grenser mot dyrka mark og busetnad. Skogen er variert, der den veksler mellom alm-hasselskog, bjørkeskog, fururabbar, svartorskog og noko granplantingar.

### **FAGLEG VURDERING**

Skogslia er stor, med mange skogtypar, m.a. alm-lindeskog og or-askeskog. Hasselkratt med alm dekkjer store delar, men det er planta mykje gran i denne typen. Midt i lokaliteten stikk ein grunnlendt knaus fram, der det står furuskog. Aust for denne knausen, i eit bekkesig, står det godt utvikla svartorskog med innslag av ask. Elles er det innslag av platanlønn, hegg, bøk og kristtorn, dei to siste truleg forvilla. Varmekjære artar; skogstarr, lundgrønaks, myske, ramslauk, skogsvingel, kjempesvingel, ormtelg, geittelg, jordnøtt, vivendel, krattmjølke, junkerbregne, krattlodnegras. Frå svartorskogen er det registrert m.a. jordnøtt, mellomtrollurt og skogkarse.

### **FORMÅLET MED VERNEFORSLAGET**

Stor variasjon i skogtypar, og stort innslag av varmekjære artar, gjer denne lokaliteten til ein av dei høgst vurderte i vernesamanheng.

### **UTFØRTE INNGREP**

Mindre delar av lia er tilplanta med gran. I nedre del grenser lokaliteten til dyrka mark, og i austdelen er det nokre gjerder og ei kraftline.

### **KJENDE INTERESSEKONFLIKTER**

Ingen

### **AKTUELLE SKJØTSELSTILTAK/MERKNADER**

Nokre av granplantingane kan det vere aktuelt å ta ut før dei skyggar ut lauvskogen. Både innslaget av granplantingar, og den store variasjonen i lauvskogen, gjer at det er naturleg å følge opp vern av området med ein skjøtselsplan.

### **KJELDER**

Bugge 1989



## **8 MULDALSLIA Norddal kommune**

Kartreferanse M711:	1319 III MQ 186 030
Areal i dekar:	606
Høgde over havet:	5 - 500 meter
Gards- og bruksnummer:	36/1-3 37/1-8 (begge eigedomane felleseige)

### **OMRÅDESKILDRING**

Vestvendt lauvskogsli mellom Muldalsfossen og Skjegghammaren. Alm dominerer i store delar av lia, medan det i nedre delar er eit markert innslag av gråor. På konvekse terrengformer dominerer hengebjørka, medan det ved Skjegghammaren og langs fossen står ein del furu.

### **FAGLEG VURDERING**

Denne lauvskogslia er svært artsrik, og med god utforming av almeskogen. Delar av lia har alm-lindeskogspreg, medan dei friaskare delane har gråor-almeskogsutforming. I tresjiktet står det i tillegg til alm, m.a. hassel, søtkirsebær, lind, ask, svartor og hegg. Varmekjære artar; junkerbregne, firblad, lundgrønaks, trollbær, vårkål, tannrot, krattfiol, kratthumleblom, sanikel, myske, storklokke, kjempesvingel (?), vårerteknapp, geittelg, fingerstarr, ormtelg, jordnøtt, kusymre, lundrapp, krattmjølke. 29 feltsjiktsartar tilhøyrande gråor-heggeskog er registrert, m.a. hengeaks, hundekveke, humle, stornesle, skogstjerneblom, tyrihjelm, kvitveis, maigull, kranskonvall, turt, og strutseveng. Ei rad andre interessante artar er også registrert i lokaliteten, som t.d. brunburkne, vanleg og grov nattfiol, brudespore, kvit skogfrue, krattlodnegras, lodnebregne, piggstarr, engtjæreblom, eittårsnavel, laukurt, skogkarse, tårnurt, skogkløver, lakrismjelt, vill-lin, lifiol, smørbukk, berberiss og småborre.

### **FORMÅLET MED VERNEFORSLAGET**

Formålet med verneforslaget er å sikre ein av dei høgst prioriterte edellauvskogs-lokalitetane i fylket. Svært stort artsutval, 106 artar høgre plantar er registrert, auker verneverdien. Området ligg innafor det foreslalte Tafjord landskapsvernområde, som ligg inntil den foreslalte Reinheimen nasjonalpark.

### **UTFØRTE INNGREP**

Det går veg og kraftline i nedkant av lia. I vestenden går en kjerreveg opp til Muldalen.

### **KJENDE INTERESSEKONFLIKTER**

Det er planlagd kraftline opp til Muldalen, trasé ikkje fastlagt. Det er planer om skogsveg og hogst på Skjegghammaren.

### **AKTUELLE SKJØTSELSTILTAK/MERKNADER**

Kjerrevegen til Muldal må vedlikehaldast.

### **KJELDER**

Skogen 1963 og 1978, Bugge og Jordal 1988



## 9 HYSKET Stranda kommune

Kartreferanse M711:	1219 II MP 041 895
Areal i dekar:	338
Høgde over havet:	0 - 550 meter
Gards- og bruksnummer:	111/1 113/1,2

### OMRÅDESKILDRING

Stor sørvest edellauvskogsli vest for Møll innerst i Geirangerfjorden. Alm gråor og hengebjørk er dominante treslag. I vestdelen dominerer hassel. Lokaliteten grenser i vest mot hamrar og stup, og ved stranda ligg ein gammel nedfallen plass der det tidlegare var dreven handelsverksemd. På sørssida av fjorden, og vidare utover til Sju Søstre er det og fleire lokalitetar med godt utvikla almeskog.

### FAGLEG VURDERING

Denne lokaliteten er av dei aller mest verneverdige edellauvskogslokalitetane i fylket. Skogen er storvaksen og vegetasjonstypene godt utvikla med både alm-lindeskog, gråor-almeskog og gråor-heggeskog. Feltsjiktet har stor bredde i artsutvalet. I tresjiktet finst m.a. alm, hassel, ask, søtkirsebær, gråor, hengebjørk og vanleg bjørk. Varmekjære artar; junkerbregne, skogfaks, lundgrønaks, ramslauk, tannrot, trollbær, vårkål, storklokke, sanikel, svarterteknapp, vårvarteknapp, myske, fingerstarr, geittelg, ormtelg, vårmarihand, jordnøtt, lundrapp, krattmjølke. Delar av lokaliteten har gråor-heggeskogspreg med m.a. stornesle, skogsvinerot, kvitveis, nyresoleie, kranskonvall, hundekveke, skogburkne, myrmaure, mjødurt, kratthumleblom, skogstjerneblom og turt. Andre interessante artar; grov nattfiol, storfrytle, krattlodnegras, humle, svartstarr, piggstarr, hårstarr, loppestarr, eittårsknavel, engtjærebblom, fagerperikum, kvit skogfrue og brudespore.

### FORMÅLET MED VERNEFORSLAGET

Formålet med verneforslaget er å sikre ei av dei best utvikla edellauvskogsliene i fylket. Saman med Muldalslia i Tafjord, representerer denne lokaliteten det beste av varmekjær lauvskog i Sunnmørsfjordane. Området ligg og innafor foreslått landskapsvernområde.

### UTFØRTE INNGREP

Utanom rester etter tidlegare busetnad ved sjøen, og spor etter flittig bruk av stranda som utfartsområde, er det ingen vesentlege inngrep i lokaliteten.

### KJENDE INTERESSEKONFLIKTER

Grunneigarane ønsker å bygge opp att fjordgarden Hysket og legge tilrette for reiselivsverksemd i området. Mest konfliktfylt med verneformålet er den eventuelle sti/vegtilkommst til Hysket langs stranda. Stranda kommune vil legge fram utkast til reguleringsplan for utbygginga før endeleg forslag til grenser og verneregler vert fastsett.

### AKTUELLE SKJØTSELSTILTAK/MERKNADER

Dersom utbygginga på Hysket kjem, er det ei stor oppgåve å sikre den naturlege vegetasjonen i området.

### KJELDER

Skogen 1963 og 1986, Bugge 1989



## **10 NESPLASSEN Stordal kommune**

Kartreferanse M711:	1219 I LQ 950 189
Areal i dekar:	461
Høgde over havet:	5 - 595 meter
Gards- og bruksnummer:	127/1-7,26,29

### **OMRÅDESKILDRING**

Sørvestnord lauvskogsli i rasmark på nordsida av Stordalsbukta. I sentrale delar av lia er ask dominante treslag. Mykje storvaksen osp, elles alm, bjørk, hassel og gråor. Det sentrale askebestandet er kransa av storsteina ur og nokre granplantefelt.

### **FAGLEG VURDERING**

Svært variert og artsrik lauvskogslokalitet på gneis. Frisk råme i rotsona og mykje nedbør legg grunnlaget for ein av dei fridigaste askeskogane i Vest-Norge. I tresjiktet finst ask, alm, hassel, gråor, osp, barlind, svartor, søtkirsebær, spisslønn, platanlønn og hegg. Varmekjære artar i feltsjiktet; firblad, kjempesvingel, skogfaks, lundgrønaks, trollbær, vårkål, kratthumleblom, svartereknapp, sanikel, skogsvinerot, myske, storklokke, geittelg, ormtelg, fingerstarr, vårmarihand, jordnøtt, skogkarse, vivendel, lundrapp, skogvikke og krattmjølke. Markert innslag av gråor-heggeskogsartar som t.d. villrips, skogburkne, strutseveng, hengeaks, hundekveke, stornesle, skogstjerneblom, tyrihjelm, kvitveis, nyresoleie, mjødurt, gauksyre, skogsvinerot og sumphaukskjegg. Vinterbeiteområde for hjort.

### **FORMÅLET MED VERNEFORSLAGET**

Formålet med verneforslaget er å sikre ein av dei aller best utvikla askeskogslokalitetane i fylket. Stor artsrikdom og andre varmekjære skogtypar innanfor lokaliteten auker verne-verdien.

### **UTFØRTE INNGREP**

Nedre delen av lokaliteten grenser mot veg og busetnad. I austdelen grenser lokaliteten mot granplantefelt, der det og er bygd skogsveg. I vest grenser lokaliteten mot eit steinbrudd.

### **KJENDE INTERESSEKONFLIKTER**

Ingen

### **AKTUELLE SKJØTSELSTILTAK/MERKNADER**

Nokre granplantingar bør kanskje fjernast i samsvar med ei framtidig skjøtselsplan.

### **KJELDER**

Skogen 1966 1972 1981, Korsmo 1975,



## **11 SULESUND Sula kommune**

Kartreferanse M711: 1119 I LQ 535 218

Areal i dekar: 432

Høgde over havet: 30 - 550 meter

Gards- og bruksnummer: 196/1,2,23 197/1

### **OMRÅDESKILDRING**

Bratt sørvest vendt svartorskog ovafor ferjeleiet på Sulesund. I aust grenser lokaliteten mot ein berghammar, og i nedkant mot veg. Vestover glir svartorskogen over i alm-hasselskog og open skredmark.

### **FAGLEG VURDERING**

Ein svært godt utvikla svartorskogslokalitet. Svartor er elles vanleg langs store delar av lia. Svartorbestandet er homogent, men elles står det alm, hassel, platanlønn, hegg, gråor og bjørk i lokaliteten. Varmekjære artar; kratthumleblom, skogsvinerot, sanikel, myske, kvitveis, vivendel, jordnøtt, kusymre, hengeaks. I tillegg kommer oreskogsartane som mellomtrollurt, kystmaigull, skogkarse, gauksyre, skogburkne, mjødurt, stornesle, raud jonsokblom, enghumleblom og sumphaukskjegg. Vinterbeiteområde for hjort.

### **FORMÅLET MED VERNEFORSLAGET**

Formålet med verneforslaget er å sikre ein kystprega, godt utvikla svartorskogslokalitet.

### **UTFØRTE INNGREP**

Ingen.

### **KJENDE INTERESSEKONFLIKTER**

Tafjord Kraft har planer om ny kraftline ved Sulesund, truleg parallelt med eksisterande kraftline.

### **AKTUELLE SKJØTSELSTILTAK/MERKNADER**

Ingen.

### **KJELDER**

Bugge 1989



## **12 RAUDNEVIKA Sula kommune**

Kartreferanse M711: 1119 I LQ 494 243  
Areal i dekar: 2108  
Høgde over havet: 0 - 475 meter  
Gards- og bruksnummer: 191/1-3

### **OMRÅDESKILDRING**

Sør- og vestvendt stor fjordli med varmekjær lauvskog vest for yste busetnaden på sørsida av Sulalandet. Bjørk dominerer tresjiktet, med store parti tett hasselkratt. Kusymre og storfrytle dominerer feltsjiktet i moldrike parti. Skogen grenser mot stup og fjellknusar i øverkant, og nedanfor skogen flatar terrenget ut mot sjøen. Her er det lyngmark og myrparti ned mot svaberga. Fleire store kløfter skjer seg inn frå sjøkanten.

### **FAGLEG VURDERING**

Sør- og vestsida av Sulalandet har store forekomstar av varmekjær lauvskog, jf. og svartor-lodaliteten ved Sulesund. Ytre delen er fri for tekniske inngrep, har stor spennvidde i naturtypar, og kan stå som typeområde for dei rike kystlauvskogane i Møre og Romsdal. Bjørk dominerer i tresjiktet, med eit konstant innslag av hassel i busksjiktet. I øverkant av skogen står noko alm. Einskildeksemplar av svartor står det og i nedkant av lia. Varmekjære artar; myske, kratthumleblom, ramslauk, sanikel, firblad, ormtelg, kusymre, mellomtrollurt, vi-vendel, jordnøtt, hengeaks. Innslaget av gråorskogsartar er moderat, med m.a. gauksyre, sløkje, skogkarse, mjødurt og skogstjerneblom. Andre interessante artar; krattlodnegras, kystmaigull, rosett-karse, fuglereir, grov nattfiol, vanlig nattfiol, trollurt og småborre.  
Vinterbeiteområde for hjort.

### **FORMÅLET MED VERNEFORSLAGET**

Formålet med verneforslaget er å sikre eit stort samanhengande og nær urørt kystsksogsområde med edellauvskog. Lokaliteten er saman med 2. Eiksund-Almstrand den høgst prioriterte av denne typen.

### **UTFØRTE INNGREP**

Det går ein lite synleg sti i nedkant av skogen, og det beiter nokre få geit i området. Under siste krig var det omfattande vedhogst her.

### **KJENDE INTERESSEKONFLIKTER**

Det kan vere aktuelt med vedhogst for salg og hyttebygging i sør-delen av området.

### **AKTUELLE SKJØTSELSTILTAK/MERKNADER**

Ingen

### **KJELDER**

Bugge 1988 og 1990



## **13 GRYTAHATLEN Haram kommune**

Kartreferanse M711: 1220 III LQ 655 369  
Areal i dekar: 97  
Høgde over havet: 40 - 275 meter  
Gards- og bruksnummer: 170/1,2 171/1,13,30

### **OMRÅDESKILDRING**

Sørvendt bratt berg med eikeskog under Skoranakken på Grytastranda.

### **FAGLEG VURDERING**

Eik har si nordgrense i Møre og Romsdal, og denne lokaliteten er ein av dei best utforma eikeskogane. Hovudbestandet dekkjer omlag eitt dekar, medan det rundt står ein del eik som buskar i berget, særleg austover til bekken frå Torvsæterhaugane. Eik er elles temmeleg vanleg langs Grytastranda. Plantesosiologisk står denne lokaliteten mellom kusymre-almeskog og lågurt-eikeskog. I tresjiktet er hassel og svartor av interesse, og frå feltsjiktet kan nemnast myske, sanikel, svarteknapp, vivendel, liljekonvall, hengeaks, krossved, kusymre og jordnøtt.

### **FORMÅLET MED VERNEFORSLAGET**

Denne lokaliteten er ikkje av dei høgst prioriterte eikelokalitetane i fylket, men bør likevel sikrast mot inngrep og hogst.

### **UTFØRTE INNGREP**

Lokaliteten grenser mot kraftline i nedkanten.

### **KJENDE INTERESSEKONFLIKTER**

Ingen.

### **AKTUELLE SKJØTSELSTILTAK/MERKNADER**

Ingen.

### **KJELDER**

Korsmo 1975, Jordal 1988



## **14 MYSKJEURDENE Haram kommune**

Kartreferanse M711:	1220 III LQ 591 484
Areal i dekar:	63
Høgde over havet:	20 - 175 meter
Gards- og bruksnummer:	12/2

### **OMRÅDESKILDRING**

Hasselkratt med noko furuskog i sørvestvendt bergstripe under Myskjafjellet, sør på Haramsøya.

### **FAGLEG VURDERING**

Hasselkratt er vanleg i sørberg på kysten i fylket, og denne lokaliteten har samanhengande vegetasjon av noko omfang. Plantesosiologisk er denne lokaliteten ein kusymre-almeskog. Feltsjiktet er typisk for varmekjære hasselkratt ved kysten, med m.a. sanikel, myske, jordnøtt, svarterteknapp, vivendel, kusymre, hengeaks, krattmjølke, lundrapp, skogburkne, vendelrot, gauksyre, krattlodnegras, englodnegras, hestehavre, fagerperikum og kvitveis.

### **FORMÅLET MED VERNEFORSLAGET**

Det er vanskeleg å finne eigna lokalitetar for vern av denne kystprega hasselkratttypen. Myskjeurdane bør sikrast mot inngrep, og lokaliteten kan vernast som naturreservat for å sikre eit døme på denne hasselkratttypen.

### **UTFØRTE INNGREP**

Det er planta noko gran i nedkanten av lokaliteten. I vest grenser området mot eit massetak.

### **KJENDE INTERESSEKONFLIKTER**

Ingen.

### **AKTUELLE SKJØTSELSTILTAK/MERKNADER**

Ingen.

### **KJELDER**

Jordal 1988



## **15 SLETTSVAET Rauma kommune**

Kartreferanse M711: 1319 I MQ 503 168  
Areal i dekar: 1235  
Høgde over havet: 130 - 625 meter  
Gards- og bruksnummer: 69/3,4,5,7 72/1 88/1

### **OMRÅDESKILDRING**

Almeskog i sørvestvendt li nedanfor Verma i Romsdalen. Markert innslag av bjørk. Almeskogen er avgrensa av fjell i øverkant, og av E69 i nedkant. Steinblokker og skredfelte tre gjer lia vanskeleg framkommeleg.

### **FAGLEG VURDERING**

Stor lokalitet med almeskog av gråor-almeskogstypen som ligg uvanleg langt inne i landet. Tresjiktet er sparsomt utvikla og prega av snøskred. Hassel i busksjiktet, og innslag av bjørk og hegg. Innergrense for nokre av dei breiblada skogsgrasa. Varmekjære artar; trollbær, storklokke, myske, krathumleblom, vårerteknapp, firblad, skogsvinerot, krattfiol, ormtelg, fingerstarr, jordnøtt, tysbast, krattmjølke, skogvikke, hengeaks og lundrapp. Stort innslag av gråorskogsartar t.d. som tyrihjelm, sløkje, skogburkne, mjødurt, gauksyre, kranskonvall, skogsvinerot, skogstjerneblom, stornesle og hundekveke. Vinterbeiteområde for hjort.

### **FORMÅLET MED VERNEFORSLAGET**

Formålet med verneforslaget er å sikre ein lokalitet av almeskog som ligg inne i landet. Lia ligg innafor det foreslalte landskapsvernombrådet i Romsdalen.

### **UTFØRTE INNGREP**

Ingen. Lokaliteten grenser mot veg, kraftline og dyrkamark i nedkant.

### **KJENDE INTERESSEKONFLIKTER**

Det kan bli aktuelt med skogsveg i sørden for tilkomst til skog utafor verneområdet. Det er dei seinare åra rydda noko skog for å betre beitetilhøva.

### **AKTUELLE SKJØTSELSTILTAK/MERKNADER**

Ingen.

### **KJELDER**

Korsmo 1975



## **16 MJØLVA Rauma kommune**

Kartreferanse M711: 1320 II MQ 347 356  
Areal i dekar: 128  
Høgde over havet: 50 - 375 meter  
Gards- og bruksnummer: 21/1 23/1,2

### **OMRÅDESKILDRING**

Meget frisk askeskog i nordvestvendt lite dalsøkk på nordsida av Romsdalen, sør for Åndalsnes. Askeskogen står på ei grusvifte. Lokaliteten grenser mot granplantefelt i vest, og elles mot fjell og ur.

### **FAGLEG VURDERING**

Feltsjiktets samansetting klassifiserar denne lokaliteten til ein gråor-almeskog med dominans av ask. Karakteristiske artar for or-askeskog er med unntak for gullstjerne ikkje påvist. Ask dominerer i tresjiktet, og er oppblanda med gråor, bjørk, selje og alm. Også hassel når opp i tresjiktet. Innslag av platanlønn og søtkirsebær. Busksjiktet er godt utvikla der steinsprang og skred held trea nede. Varmekjære artar; kratthumleblom, firblad, skogsvinerot, trollbær, lundgrønaks, skogsvingel, myske, vårvarteknapp, krattfiol, gullstjerne, ormtelg, geittelg, krattmjølke, lundrapp, hengeaks. Markert innslag av gråor-heggeskogsartar som t.d. sløkje, skogburkne, mjødurt, skogsvinerot, skogstjerneblom, stornesle, hundekveke, tyrihjelm, kvitveis, turt, lerkespore, sumphaukskjegg.

### **FORMÅLET MED VERNEFORSLAGET**

Formålet med verneforslaget er å sikre ein av dei nordlegaste askeskogslokalitetane på Vestlandet. Saman med rikt artsutval og små inngrep gjer dette at lokaliteten har nasjonal verneverdi.

### **UTFØRTE INNGREP**

Det står noko gran i neddelen av lokaliteten, og det er tre vassuttak i dalen.

### **KJENDE INTERESSEKONFLIKTER**

Ingen.

### **AKTUELLE SKJØTSELSTILTAK/MERKNADER**

Grantrærne innenfor det aktuelle verneområdet bør takast ut før dei eventuelt frør seg. Det kan vere aktuelt å utarbeide skjøtselsplan for denne lokaliteten.

### **KJELDER**

Korsmo 1975, Holten 1984



## **17 UNHJEMSLIA Rauma kommune**

Kartreferanse M711: 1320 II MQ 429 397  
Areal i dekar: 645  
Høgde over havet: 75 - 620 meter  
Gards- og bruksnummer: 47/6,8,10,11,13,34

### **OMRÅDESKILDRING**

Sør vendt bratt lauvskogsli i Grøvdalen, aust for Hen i Isfjorden. Hassel dominerer tresjiktet i nedre delen av lia, og med rikeleg innslag av osp og dels alm. Øvre delar av lia har mest bjørk og osp, med eit markert innslag av furu. Delar av lia har storsteina ur. I nedre delen grenser skogen mot dyrka mark og veg.

### **FAGLEG VURDERING**

Varmekjær hasselskog av alm-lindeskogstypen. Hassel, osp og dels alm dominerer tresjiktet, med innslag av m.a. ask, gråor, bjørk og hegg. Kalkfjell i grunnen. Varmekjære artar; skogsvingel, kjempesvingel, skogfaks, lundgrønaks, sanikel, myske, falkbregne, skogstarr og fingerstarr. I tillegg er ei rekke floristisk interessante artar registrert. Særleg viktig er ein stor forekomst av kvit skogfrue, men og trollhegg, taggbregne, breiflangre, vanlig nattfiol og brudespore. Hasselforekomstane er i stor grad samla i eit band nede ved lifoten.

### **FORMÅLET MED VERNEFORSLAGET**

Formålet med verneforslaget er å sikre ein varmekjær og artsrik edellauvskogslokalitet, der særleg forekomsten av kvit skogfrue er verdfull.

### **UTFØRTE INNGREP**

Ingen.

### **KJENDE INTERESSEKONFLIKTER**

Det kan vere aktuelt med skogsdrift i delar av lia.

### **AKTUELLE SKJØTSELSTILTAK/MERKNADER**

Forekomsten av kvit skogfrue må overvakast for å sikre livsvilkåra.

### **KJELDER**

Marker 1977, Bugge 1992



## **18 STAKKENGONNA Nesset kommune**

Kartreferanse M711: 1419 IV MQ 629 248  
Areal i dekar: 465  
Høgde over havet: 140 - 525 meter  
Gards- og bruksnummer: 79/3,8,17 80/1-4

### **OMRÅDESKILDRING**

Almeskog på sørvestvendt grusvifte innafor Littlevatnet i Eikesdal. Bestandet er avgrensa av fjell, ur og lauvskog, og mot elva i sør.

### **FAGLEG VURDERING**

Gråor-almeskogstype med alm som dominerande treslag, og med innslag av hassel og osp og noko bjørk. Sparsomt busksjikt med hegg, frodig feltsjikt. Varmekjære artar; trollbær, storklokke, myske, kratthumleblom, firblad, skogsvinerot, krattfiol, skogfaks, skogsvingel, ormtelg, krattmjølke, skogvikke, hengeaks og lundrapp. Gråorskogsartar; tyrihjelm, kvitveis, sløkje, hundekjeks, skogburkne, mjødurt, gauksyre, kranskonvall, nyresoleie, skogstjerneblom, stornesle og hundekveke. Lokaliteten er ein av dei mest verdfulle edellauv-skogslokalitetane i Eikesdal.

### **FORMÅLET MED VERNEFORSLAGET**

Lokaliteten sin verneverdi er vurdert etter Jutneset-Asalhammaren men er av stor botanisk interesse.

### **UTFØRTE INNGREP**

Ingen.

### **KJENDE INTERESSEKONFLIKTER**

Ingen.

### **AKTUELLE SKJØTSELSTILTAK/MERKNADER**

Ingen.

### **KJELDER**

Korsmo 1974



## **19 JUTNESET-ASALHAMMAREN Nesset kommune**

Kartreferanse M711: 1320 II MQ 559 308  
Areal i dekar: 2035  
Høgde over havet: 20 - 1082 meter  
Gards- og bruksnummer: 79/2,4,5,9-12,34

### **OMRÅDESKILDRING**

Almeskog og hasselkratt på austsida av Eikesdalsvatnet, nord for Mardalen.

### **FAGLEG VURDERING**

Gråor-almeskogstype med innslag av bjørk og hassel i tresjiktet. Hegg og rogn i busksjiktet. Svært frodig feltsjikt der gråorskogsartar dominerer. Varmekjære artar; trollbær, storklokke, myske, kratthumleblom, vårerteknapp, firblad, sanikel, skogsvinerot, skogfaks, skogsvingel, kvitveis, ormtelg, geittelg, fingerstarr, krattmjølke, skogvikke, hengeaks og lundrapp. Gråorskogsartar; tyrihjelm, sløkje, skogburkne, engsnelle, mjødurt, enghumleblom, strutseveng, gauksyre, kranskonvall, bringebær, skogstjerneblom, stornesle og hundekveke.

### **FORMÅLET MED VERNEFORSLAGET**

Formålet med verneforslaget er å sikre den best utvikla varmekjære almeskogen i Eikesdal. Eikesdalen er et kjerneområde for varmekjær lauvskog, og saman med den store hassellokaliteten på Øvre Vike, er denne lokaliteten av størst verdi.

### **UTFØRTE INNGREP**

Ingen.

### **KJENDE INTERESSEKONFLIKTER**

Ingen.

### **AKTUELLE SKJØTSELSTILTAK/MERKNADER**

Ingen.

### **KJELDER**

Korsmo 1975



## **20 ØVRE VIKE Nesset kommune**

Kartreferanse M711: 1320 II MQ 583 357  
Areal i dekar: ca 2000  
Høgde over havet: 20 - 600 meter  
Gards- og bruksnummer: 78/1-5

### **OMRÅDESKILDRING**

Stor homogen vestvendt lauvskogsli ved Eikesdalsvatnet, sør for Furneset. Hengebjørk dominerer i tresjiktet, med innslag av alm og osp. Stort innslag av hassel og hasselkratt. Tidledare var hasselen i Eikesdalen utnytta gjennom nøttesanking og tønnebandproduksjon. Etter at aktiviteten i skogen sank, bærer hasselen mindre nötter, og den tidlegare kulturskogen er i forfall.

### **FAGLEG VURDERING**

Svært stor varmekjær lauvskogsli, rekna som ein av Nord-Europas største hasselskogar. Saman med hassel dominerer hengebjørk, med innslag av alm og osp. På friske parti dominerer gråor. Feltsjiktet er glissent og prega av beiting. Sparsomt innslag av varemekjære artar; myske, sanikel, vårerteknapp, kratthumleblom, skogsvinerot, ormtelg, hengeaks. Gråorskogsartar; gauksyre, enghumleblom, stornesle, bringebær, kvitveis, tyrihjelm, mjødurt, skogstjerneblom, sløkje og skogburkne. Andre artar; taggbregne, krattlodnegras, skogkarse. Vinterbeiteområde for hjort.

### **FORMÅLET MED VERNEFORSLAGET**

Formålet med verneforslaget er å sikre ein av Nord-Europas største hasselskogslokalitetar. Etter at vegen vart bygd, er det sett igang mange ulike utbyggingsprosjekt i nedkanten av lia. Dette, saman med at verneverdiane er så sterkt knytte til den bruken av området ein tidlegare hadde, gjer at ein finn det lite eigna å foreslå vern som naturreservat. Det viktigaste i dette området er å hindre vidare granplanting, samt å få til ordningar med skjøtsel slik at delar av dei rike hasselkratta kan haldast i hevd. Grunneigarane er positive til ei slik løysing, og vil bidra til å gjennomføre skjøtselen.

### **UTFØRTE INNGREP**

Det er bygd ny veg langs vatnet, og med utgangspunkt i denne fleire skogsvegar, campingplass m.m. Hasselen har tidlegare vore utnytta. Ved Øvre Vike er det ein gard, og nokre små granfelt.

### **KJENDE INTERESSEKONFLIKTER**

Det er planlagt hyttebygging ved Øvre Vike.

### **AKTUELLE SKJØTSELSTILTAK/MERKNADER**

Det kan vere interessant å restaurere delar av den gamle kulturhasselskogen.

### **KJELDER**

Marker 1977, Løfall 1989



## 21 HAGSET Midsund kommune

Kartreferanse M711: 1220 II LQ 890 534  
Areal i dekar: 217  
Høgde over havet: 35 - 400 meter  
Gards- og bruksnummer: 38/1,2,3

### OMRÅDESKILDRING

Sørvestnord lauvskogsli på sørsida av Otterøya. Svært variert lokalitet med svartorskog, hasselkratt og barlind. Svartorbestandet har tyngdepunkt langs bekkedalen vest i lokaliteten. Barlind står spredd i små klynger fleire stader, men ser ut til å være knytta til hasselkratta. Flekkvis er det fattigare parti med bjørk, og innslag av gråor, osp og furu. Lokaliteten grenser til hogst og vegbygging i vest, mot veg i nedkant, og mot skrinnare mark og knausar i aust.

### FAGLEG VURDERING

Botanisk svært interessant lokalitet. Hasselskogen har tydeleg kystpreg, ein av dei nordlereste lokalitetane av kusymre-almeskogstypen. Svartorbestandet og det store innslaget av barlind på norgrensa av si utbreiing gir denne lokaliteten høg prioritet. Stort innslag av krevjande og varmekjære artar i feltsjiktet; myske, lundgrønaks, kratthumleblom, ramslauk, sanikel, vårkål, skogfredlaus, ormtelg, fingerstarr, kvitveis, kusymre, jordnøtt, vivendel, krattmjølke, lundrapp og hengeaks. Svartorskogen og parti med gråorskog har innslag av alm og hassel, og frodig feltsjikt med m.a. ramslauk, vårkål, kusymre, myrmaure, skogburkne, sløkje, bringebær, krypsoleie, gauksyre, hundekveke, turt, sumphaukskjegg, enghumleblom, skogsvinerot, mjødurt. Andre interessante artar; svartknoppurt i vegkant, krattlodnegras, ryllsiv, brunrot, krossved, grov nattfiol, fagerperikum.

### FORMÅLET MED VERNEFORSLAGET

Formålet med verneforslaget er å sikre ein uvanleg variert og artsrik edellauvskogslokalitet med kystpreg. Forekomsten av barlind auker verneverdien vesentleg. Denne lokaliteten har høgst verneverdi i ytste Romsdal.

### UTFØRTE INNGREP

Vest for lokaliteten er det bygd skogsveg (vassverk?) og noko gran er planta. Ved vegen er det hogst i eit furuholt.

### KJENDE INTERESSEKONFLIKTER

Fylkesvegen nedanfor lokaliteten skal utbedrast. Grustak til eige bruk i nedkanten.

### AKTUELLE SKJØTSELSTILTAK/MERKNADER

Ingen.

### KJELDER

Korsmo 1976, Bugge og Jordal 1988, Bugge 1990



## **22 RAUSANDBERGET Averøy kommune**

Kartreferanse M711: 1321 III MQ 327 934  
Areal i dekar: 251  
Høgde over havet: 0 - 170 meter  
Gards- og bruksnummer: 50/11 53/14,19,53,78 (kanskje felles utmarksrettar)

### **OMRÅDESKILDRING**

Sørhelling mot fjorden ved Kristvik med rike urskogsprega hasselkratt. Storsteina ur deler opp tresjiktet. Opp på steinblokkene er det lyng og einer, medan det i nedre delar er oppkomme av vatn og svært frodig. På toppen av berget nord for for hassellokaliteten, er det eit verneverdig typeområde for lyngheivevegetasjon.

### **FAGLEG VURDERING**

Artsrik hasselskog av kusymre-almeskogstypen. Utanom hassel er det innslag av m.a. osp, ask og platanlønn. Stor forekomst av den sjeldne orkideen kvit skogfrue gjer denne lokalitten særverdig. Ellers er det registrert varmekjære artar som sanikel, svart erteknapp, ramslauk, trollbær, lundgrønaks, skogfaks, myske, ormtelg, vivendel, kusymre og breiflangre.

### **FORMÅLET MED VERNEFORSLAGET**

Formålet med verneforslaget er å sikre ein rik hassellokalitet med ein av fylkets største forekomstar av kvit skogfrue.

### **UTFØRTE INNGREP**

Ingen.

### **KJENDE INTERESSEKONFLIKTER**

Ingen.

### **AKTUELLE SKJØTSELSTILTAK/MERKNADER**

Ingen.

### **KJELDER**

Holten 1978.



## **23 BOKSASPA Tingvoll kommune**

Kartreferanse M711:	1320 I MQ 467 861
Areal i dekar:	17
Høgde over havet:	5 - 25 meter
Gards- og bruksnummer:	139/2,6

### **OMRÅDESKILDRING**

Mindre parti med eikeskog i jordbrukslandskap på sørsida av Aspøya. Eikeskogen er oppblanda med osp og noko rogn, samt hassel, furu, bjørk og hegg. Eikeholtet grenser mot kjerreveg og dyrka mark i nord, og elles mot lauvskog og beitemark.

### **FAGLEG VURDERING**

Lokaliteten er verdens nordlegaste eikeskog av noko storleik, og har stor vitensCAPELEG interesse. Det er god forynging av eik i lokaliteten. Feltsjiktet har lågurtpreg, med m.a. myske, krathumleblom, sanikel, kusymre, ormteg, markjordbær, liljekonvall, krattlodnegras, hengeaks, lundrapp og skogfiol. I friske parti er det markant innslag av gråor-heggeskogsartar. Kraftig lav- og soppvokster på ekestubber. Sjeldne soppartar som er registrert; bøkesøtriske, ruterørsopp og lumsk rødkivesopp.

### **FORMÅLET MED VERNEFORSLAGET**

Formålet med verneforslaget er å sikre ein svært verdfull eikeskogslokalitet med mangfaldig lav- og soppvegetasjon.

### **UTFØRTE INNGREP**

Det er eit gjennomgåande kulturpreg i heile lokaliteten, etter beiting og anna bruk. Det er og nyleg bygd ei lokal kraftline gjennom skogen, og det ligg to hytter like inntil. Det er planta noko gran i og inntil lokaliteten.

### **KJENDE INTERESSEKONFLIKTER**

Beiting av sau og storfe ser ut til å fungere positivt for eikeskogen. Grunneigaren ønsker å rydde strandskogen for beite, åker og campingbil-plass.

### **AKTUELLE SKJØTSELSTILTAK/MERKNADER**

Det må takast opp med grunneigar korleis området best bør vernast/brukast slik at ein sikrer denne unike eikelokaliteten. Lokaliteten har vore vitja av botanikarar frå ulike miljø sidan mellomkrigstida, og har slik stor vitensCAPELEG interesse.

### **KJELDER**

Hagen 1972, Korsmo 1975, Jordal pers.medd.



## 24 EIKREM Tingvoll kommune

Kartreferanse M711: 1321 II MQ 497 864  
Areal i dekar: ca 1100  
Høgde over havet: 0 - 160 meter, 0 - 70 meter for den mest verdfulle delen  
Gardsnummer: 106/1-8,10,11,13,14,15,18,20,21,23,24,29,  
32,34,35,40,43,48,53,56 107/12

### OMRÅDESKILDRING

Eik som enkelttre eller mindre bestand i eit jordbrukslandskap på Eikrem på vestsida av Tingvollhalvøya. Saman med eika står det mest bjørk, hassel, furu og osp.

### FAGLEG VURDERING

Botanisk interessant lokalitet med eik på nordgrensa av si naturlege utbreiing. Det er god forekomst av eiketre over eit større område, men fullt så gode bestand som ein har på Aspøya (Bokksaspa) finn ein ikkje. Det er god forynging av eik i området, også ved frøspreiing i gode år. Feltsjiktet har preg av grasmark, og har eit sparsomt innslag av lågurter. Langs stranda, ofte i sig frå eng, står fleire mindre bestand med svartor. I sør vendte skråninger ned mot sjøen er floraen rikere, under kraftige hasselkratt. Den absolutte nordgrensa for eik ligg litt nord for Eikrem, ved Ødegård, der ein finn einskildtre spreidd ned mot sjøen.

### FORMÅLET MED VERNEFORSLAGET

Denne eikeforekomsten er spreidd i kulturlandskapet, og heile området eignar seg ikkje til vern som naturreservat. Det er likevel av stor interesse å sikre eikeskogen gjennom skjøtsel og spesielle tiltak i kommuneplansamanhang. Dei høgst prioriterte delområda B og C bør vernast som naturreservat. Desse er ifølgje kartet eigd av 106/2,3,5,8,14, samt mulegvis nokre hytteeigedomar.

### UTFØRTE INNGREP

Området med eik er sterkt oppsplitta av gardstun, dyrka mark og vegar. Det blir berre unntaksvis hogd eik i området.

### KJENDE INTERESSEKONFLIKTER

Ingen, dersom ein får til avtalar med grunneigarane om vern og skjøtsel.

### AKTUELLE SKJØTSELSTILTAK/MERKNADER

Det bør vurderast om det er trøng for skjøtselstiltak for å sikre forynging av eika. Nokre av dei beste bestandane bør avgrensast og sikrast spesielt gjennom ein skjøtselsplan. Dei to mest verdfulle delområda er avgrensa på kartet med heiltrukken strek, to andre viktige område med stipla strek.

### KJELDER

Hagen 1972, Korsmo 1975, Bugge 1991.



## **25 KANSDAL-VULVIK Tingvoll kommune**

Kartreferanse M711: 1320 I MQ 536 826  
Areal i dekar: 647  
Høgde over havet: 0 - 529 meter  
Gards- og bruksnummer: 28/1 29/1 30/1

### **OMRÅDESKILDRING**

Sørvestvendt lauvskogsli mot Tingvollfjorden, nord for Gyl. I lia er det fleire mindre forekomstar av edellauvskog, oppstykka av nakent fjell og fattigare skogsparti. Lokaliteten grenser i nedkant mot veg, dels går vegen gjennom tunnell.

### **FAGLEG VURDERING**

Alm-hasselskog av alm-lindeskogstypen med eit av fylkets største utval av varmekjære artar. I tresjiktet er det innslag av hegg, bjørk, osp, gråor, svartor, ask og platanlønn. Dette er ein "klassisk" botanisk lokalitet som har vore flittig nyttta i undervisninga på høgskolenivå. Frå den rikhaldige artslista kan nemnast; ramslauk, trollbær, myske, skogfaks, kjempesvingel, lundgrønaks, sanikel, vårerteknapp, svarterteknapp, storklokke, skogsvingel, krattfiol, lundkarse, vårmarihand, kvit skogfrue, fuglereir, breiflangre, piggstarr, skogflatbelg, junkerbregne, fingerstarr, lerkespore og brudespore. Vinterbeiteområde for hjort.

### **FORMÅLET MED VERNEFORSLAGET**

Formålet med verneforslaget er å sikre ein av dei mest artsrike edellauvskogslokalitetane i fylket. Lokaliteten sin lange historie som botanisk ekskursjonslokalitet auker verneverdien.

### **UTFØRTE INNGREP**

Det er planta nokre granfelt i området.

### **KJENDE INTERESSEKONFLIKTER**

Ingen.

### **AKTUELLE SKJØTSELSTILTAK/MERKNADER**

Ein må vurdere om når og på kva måte ein skal ta ut granfelta i området.

### **KJELDER**

Hagen 1972, Korsmo 1975, Marker 1977



## **26 KNUTSLIØYAN Sunndal kommune**

Kartreferanse M711:	1420 II MQ 874 461
Areal i dekar:	140
Høgde over havet:	50 - 130 meter
Gards- og bruksnummer:	37/1,6

### **OMRÅDESKILDRING**

Gråorskog og almeskog i ein sørvestvendt terrasse ned mot Driva, like ovafor Grøa. Lokaliteten grenser mot beitemark og skrinn furuskog i nord, mot skogsveg i aust, mot eit skredlaup i vest og mot elva i sør.

### **FAGLEG VURDERING**

Svært godt utvikla gråor-heggeskog med uvanleg homogen utforming. Markant innslag av alm, men berre få varmekjære artar i feltsjiktet; trollbær, storklokke, myske, kratthumleblom, sanikel, ormtelg, krattmjølke, hengeaks og lundrapp. Stort utval av gråor-heggeskogsartar med m.a. rips, tyrihjelm, sløkje, skogburkne, maigull, sumphaukskjegg, mjødurt, enghumleblom, springfrø, strutseveng, firblad, skogsvinerot, skogstjerneblom, stornesle, trollurt, vendelrot og hundekveke. Lokaliteten er liten i areal, men har likevel eit tett bestand med holerugande fugl.

### **FORMÅLET MED VERNEFORSLAGET**

Formålet med verneforslaget er å sikre ein godt og typisk utvikla gråor-heggeskogslokalitet med innslag av alm, og slik å sikre eit viktig leveområde for hulerugande fugl.

### **UTFØRTE INNGREP**

Det er planta litt gran i austenden av lia, ved elva ligg restane etter ein plass med litt dyrka mark rundt. I vestdelen av lokaliteten går ein skogsveg ned til elva.

### **KJENDE INTERESSEKONFLIKTER**

Grunneigaren har planer om å utvide vegen gjennom lokaliteten for å kome fram med traktor. Viktig område for uttak av gardsved. Det kan bli aktuelt å ta opp at storfebeitinga i området, noko som krev rydding for beite.

### **AKTUELLE SKJØTSELSTILTAK/MERKNADER**

Dersom vegen skal opprustast må det skje særleg skånsomt. Det kan bli aktuelt å utarbeide skjøtselsplan for lokaliteten.

### **KJELDER**

Korsmo 1975



## **27 OPDØLSTRANDA-SANDVIKDALEN Sunndal**

Kartreferanse M711: 1420 III MQ 775 536  
Areal i dekar: 3990  
Høgde over havet: 0 - 1428 meter  
Gards- og bruksnummer: 51/31,34,38,155 91/1

### **OMRÅDESKILDRING**

Stor vestevendt fjordli innerst i Sunndalsfjorden med alm-hasselkog, oppbroten av berg-hamrar. Med i lokaliteten er også almeskog i dei nedre delane av Sandvikdalen.

### **FAGLEG VURDERING**

Edellauvskogsbestandane i lia langs fjorden er av alm-lindeskogstypen, medan almeskogen i nedre delen av Sandvikdalen har større innslag av gråorskogsartar, og klassifiserast slik som gråor-almeskog. Varmekjære artar langs fjorden; lundgrønaks, kjempesvingel, skogfaks, myske, svartereknapp, vårerteknapp, krattfiol, skogsvingel, fingerstarr, vårmarihand, lundrapp. Kusymre vart og registrert her nord for Hårvikbekken i 1979, den innerste lokaliteten i fylket. Kusymre veks truleg ikkje innafor dei foreslårte grensene. I Sandvikdalen er dei varmekjære artane noko færre, med skogfaks og kjempesvingel som dei mest eksotiske. Sandvikdalen har derimot eit breitt utval av gråorskogsartar, som t.d. mjødurt, skogsvinerot, stornesle, kratthumleblom, skogstjerneblom, sløkje, storklokke, tyrihjelm, kranskonvall, turt, strutseveng og firblad. Av andre interessante artar som er registrert i denne lokaliteten kan nemnast; engtjæreblom, kantkonvall, raudkjeks, kransmynte, breiflangre, humle, lodneperikuum, gulflatbelg, krossved, vanleg nattfiol, lifiol, og skogkarse.

### **FORMÅLET MED VERNEFORSLAGET**

Formålet med verneforslaget er å sikre eit stort, samanhengande edellauvskogsområde med rikt artsutval og stor variasjon.

### **UTFØRTE INNGREP**

Det går ei stor kraftline i Sandvikdalen. Langs sjøen går riksvegen, dels gjennom tunellar.

### **KJENDE INTERESSEKONFLIKTER**

Ingen.

### **AKTUELLE SKJØTSELSTILTAK/MERKNADER**

Ingen.

### **KJELDER**

Korsmo 1975, Holten 1979, Jordal 1988



## **28 SMÅVOLL Sunndal og Oppdal kommunar**

Kartreferanse M711:	1420 II NQ 069 385
Areal i dekar:	378
Høgde over havet:	215 - 760 meter
Gards- og bruksnummer:	Sunndal: 4/1, 5 6/1 Oppdal: 141/2

### **OMRÅDESKILDRING**

Almeskog og tørrbakkevegetasjon på kalkgrunn øverst i Sunndalen inntil fylkesgrensa, og dels noko inn på Oppdal-sida. Aust i lokaliteten ligg eit kjerneområde med almeskog på omlag 110 dekar. Elles er dei tresatte delane av lokaliteten prega av bjørk, hassel, gråor, rogn og noko hegg.

### **FAGLEG VURDERING**

Almeskogen er av gråor-almeskogstypen, og har størst interesse p.g.a av innslaget av tørrbakkeartar og nokre kontinentale artar. Varmekjære artar; trollbær, storklokke, myske, krattfiol, firblad, skogsvinerot, kratthumleblom, vårerteknapp, skogvikke og lodneperikum. Andre interessante artar; skogflatbelg, humle, kung, kransmynte, mørk kongslys, filtkongslys, tårnurt, krattslirekne og hestehavre. Viktig område for sjeldne insekter. Vinterbeite for hjort.

### **FORMÅLET MED VERNEFORSLAGET**

Lokaliteten er floristisk svært interessant, og bør sikrast ved vern etter naturvernlova.

### **UTFØRTE INNGREP**

Det er planta litt gran i området, og lokaliteten grensar til veg i nedkant, og til kraftline i soraustenden.

### **KJENDE INTERESSEKONFLIKTER**

Ingen.

### **AKTUELLE SKJØTSELSTILTAK/MERKNADER**

Ingen.

### **KJELDER**

Korsmo 1975, Marker 1977.



## **29 OTTEM Sunndal kommune**

Kartreferanse M711: 1420 II NQ 016 398  
Areal i dekar: 1660  
Høgde over havet: 165 - 850 meter  
Gards- og bruksnummer: 21/1-4

### **OMRÅDESKILDRING**

Stor sørvestvendt og relativt slakt hellande raskjegle med gråorskog mellom gardane Øvre og Ytre Ottem. Mot nordvest, under Hesthamran, står eit homogent og artsrikt almebestand.

### **FAGLEG VURDERING**

Gråorbestandet på raskjegla er truleg det største på Nordmøre. Feltsjiktet er dominert av høgstauder, med tyrihjelm og storborgnene skogburkne og strutseveng som mest framtredande artar. I våraspektet dominerer vanlig lerkespore, maigull, fjellfiol og kvitveis. Almeskogen under Hesthamran er relativt homogen, med noe innslag av bjørk, gråor, hegg, humle og rogn i tre- og busksjiktet. Feltsjiktet er dominert av høgstauder som stornesle, skogsvinerot, tyrihjelm, storklokke og mjødurt. Interessante artar; trollbær, ormtelg, lundrapp, myske, kratthumleblom, krattfiol, småborre, trollurt, piggstarr, og skogfaks som her har si innergrense på Nordvestlandet.

### **FORMÅLET MED VERNEFORSLAGET**

Formålet med verneforslaget er å sikre ein av dei største og best utforma høgstaude-gråorskogane i fylket. Saman med almeforekomsten har denne lokaliteten stor naturfagleg verdi.

### **UTFØRTE INNGREP**

Det står eit mindre granfelt i området.

### **KJENDE INTERESSEKONFLIKTER**

Det beiter 8-10 storfe i gråorskogen som er tynna noko for å betre beitetilhøva. Det har vore levert gråor som flisvirke, og til vanleg hogg dei 1-2 mål i gongen. Det er hogd bjørkaved for salg.

### **AKTUELLE SKJØTSELSTILTAK/MERKNADER**

Fortsatt bruk til beite, vedhogst og eventuelt flishogst må eventuelt avklarast gjennom grensetrekking og/eller skjøtselsplan.

### **KJELDER**

Korsmo 1975, Holten 1979



## **30 KALSET-KUVIKA Surnadal og Halsa kommunar**

Kartreferanse M711:	1421 III MQ 635 884
Areal i dekar:	2576
Høgde over havet:	0 - 901 meter
Gards- og bruksnummer:	Halsa: 6/1,2,3,5 Surnadal: 99/1

### **OMRÅDESKILDRING**

Sørvestvendt li med alm og gråor, og innslag av hassel og hegg, ytst i Bøfjorden. Eit kjerneområde ligg mellom Kalsetelva og Rorbekken, men også utover fjorden mot Kvalnesvik i Halsa står det mykje rik skog med hassel og alm.

### **FAGLEG VURDERING**

Stor samanhengande fjordli med varmekjær lauvskog. Svært artsrik gråor-almeskog, med mange av artane frå alm-lindeskogstypen. Inne i gråorskogen står det gamle lauva almetre på fleire kubikkmeter. Varmekjære artar; trollbær, ramslauk, myske, svarterteknapp, vårettekapp, firblad, junkerbregne, falkbregne, sanikel, lundgrønaks, skogfaks, kjempesvingel, skogstarr, lundkarse, geittelg, ormtelg, fingerstarr, vårmarihand, lundrapp. Andre interessante artar; trollurt, laukurt, brudespore, breiflangre, fuglereir, stortveblad, skogkarse, taggbregne, brunrot, kransmynte, grov og vanleg nattfiol. Ialt er det registrert 25 karakterartar for gråor-heggeskog, m.a.; tyrihjelm, kvitveis, storklokke, sumpfaukeskjegg, kratthumleblom, humle, firblad, skogsvinerot, skogstjerneblom, hengeaks og hundekveke.

### **FORMÅLET MED VERNEFORSLAGET**

Formålet med verneforslaget er å sikre eit edellauvskogsområde med ein av dei mest artsrike alm-hasselkogslokalitetane i fylket. Feltsjiktet har stort innslag både av alm-lindeskogsartar og av gråor-almeskogsartar, og har slik vitenskapeleg interesse for å vurdere utbreiinga av dei to almeskogstypane.

### **UTFØRTE INNGREP**

Litt granplanting. Det går ein god gangsti, dels køyrbar med traktor, frå Kalset til Kvalnesvika. 2-3 hytter er bygd nede ved sjøen.

### **KJENDE INTERESSEKONFLIKTER**

Det er planlagt skogsveg frå Kallset for tilkomst til Kvalnesvika, enkel standard og ikkje ope for ålmenta. Traseen er oppretta av skogbrukssetaten. Det kan bli aktuelt med bygging av kraftline langs same trase for å knyte saman linja mellom Kvalnesvik og Kallset. Ein grunneigar vil ankre opp oppdrettsanlegg i Kuvika, samt ha velteplass for tømmer her. Nokre av grunneigarane har planer om hyttebygging. Det står fleire granfelt i området som må takast ut. To av grunneigarane har det mykje av den skogproduktive utmarka si innafor det aktuelle verneområdet.

### **AKTUELLE SKJØTSELSTILTAK/MERKNADER**

Før eventuelt endeleg forslag til avgrensing vert lagt fram, må ressurssituasjonen for dei berørte brukarne kartleggast, og ein må finne ei avgrensing som minimaliserar konfliktene.

**KJELDER:** Korsmo 1975, Marker 1977, Moen 1969, Bugge 1991



## **31 BRØSKE Surnadal kommune**

Kartreferanse M711: 1420 IV MQ718 785  
Areal i dekar: 86  
Høgde over havet: 5-185 meter  
Gards- og bruksnummer: 119/1

### **OMRÅDESKILDRING**

Alm-hasselskog i ein terrasseliknande sørvestvendt li nord for Stangvik. Hassel er dominerande treslag, med mindre almebestand og innslag av selje, gråor og bjørk. Næringsrik berggrunn legg grunnlaget for ein uvanleg rik flora. I nord grenser lokaliteten til planta granskog, og i nedkant mot ein veg.

### **FAGLEG VURDERING**

Svært artsrik og varmekrevjande edellauvskog av alm-lindeskogstypen. I tillegg til alm og hassel, er det innslag av ask, svartor, hegg og gråor. Mange av dei eksklusive edellauv-skogsartane er i denne lokaliteten på eller ved sin nordgrense, som kjempesvingel, skogstarr, ramslauk, lundgrønaks og skogfaks. Andre varmekjære artar; trollbær, myske, svarterteknapp, vårværtekapp, sanikel, slakkstarr, krattfiol, skogsvingel, fingerstarr, vårmarihånd og lundrapp. Andre interessante artar; hagtorn, akeleie, småborre, breiflangre, knollerteknapp, sølvål, laukurt, vill-lauk, hengepiggrø, samt ei rekke gråor-heggeskogsartar.

### **FORMÅLET MED VERNEFORSLAGET**

Formålet med verneforslaget er å sikre den nordaustlegaste lokaliteten i fylket av denne svært varmekrevjande vegetasjonstypen. Ei rad krevjande og sjeldne artar auker verneverdien.

### **UTFØRTE INNGREP**

Det er planta noko gran inntil og i lokaliteten, og i nedkant grenser lokaliteten mot ein veg og ei lokal kraftline. Det er bygd nokre hytter i nedkant av lokaliteten.

### **KJENDE INTERESSEKONFLIKTER**

Ingen.

### **AKTUELLE SKJØTSELSTILTAK/MERKNADER**

Ved eventuell gjennomføring av vern, må granplantingane takast opp til vurdering.

### **KJELDER**

Korsmo 1975, Holten 1975, Marker 1977.



## **32 SVORKALIA Surnadal og Rindal kommunar**

Kartreferanse M711:	1421 II NQ 056 904
Areal i dekar:	225
Høgde over havet:	50 - 260 meter
Gards- og bruksnummer:	Surnadal: 1/1,2,4,7 Rindal: 69/1,2,3,4,20,43

### **OMRÅDESKILDRING**

Edellauvskogsli i sør austvendt li på kommunegrensa mellom Surnadal og Rindal. Lokaliteten grenser i nedkant mot veg, og elles mot granfelt, bjørkeskog og beitemark. Aust i lokaliteten kjem elva Svorka med utlaupet i Surna, og i denne delen er alm-hasselskogen best utvikla. I resten av lia dominerer hassel med innslag av alm, gråor og andre lauvtre som osp, hegg og bjørk.

### **FAGLEG VURDERING**

Gråor-heggeskogsartar dominerer i feltsjiktet, medan innslaget av varmekjære artar er relativt sparsomt. Typisk utforming av gråor-almeskog. varmekjære artar; trollbær, junkerbregne, krattfiol, vårerteknapp, myske, fingerstarr, ormtelg, lodneperikum og lundrapp. Gråor-heggeskogsartar; tyrihjelm, kvitveis, storklokke, kratthumleblom, firblad, skogsvinerot, sløkje, skogburkne, sumphaukeskjegg, mjødurt, humle, strutseveng, gauksyre, skogstjerneblom, stornesle, hundekveke og springfrø.

### **FORMÅLET MED VERNEFORSLAGET**

Formålet med verneforslaget er å sikre ein typisk lokalitet med gråor-almeskog i indre strøk av fylket.

### **UTFØRTE INNGREP**

Det går ei stor kraftline diagonalt gjennom lokaliteten, med tilhøyrande hogstgate.

Traktorveg gjennom lia. Lite privat kraftverk nedst i Svorka.

### **KJENDE INTERESSEKONFLIKTER**

#### **AKTUELLE SKJØTSELSTILTAK/MERKNADER**

Skjøtselen av hogstgata må vurderast. Grunneigar på 1/1 tar ut hesjestaur og gjerdestolper i lokaliteten.

### **KJELDER**

Korsmo 1975, Marker 1977



### **33 TODALSSETRA Aure kommune**

Kartreferanse M711: 1421 II MR 889 108  
Areal i dekar: 299  
Høgde over havet: 85 - 495 meter  
Gards- og bruksnummer: 21/3

#### **OMRÅDESKILDRING**

Sørvendt lauvskogsli med eit godt utvikla almebestand, kransa av fjellknauser og bjørkeskog, inst i Todalen. Hassel, krossved og hegg i busksjiktet. Nedre delen av lia ender i ein gråorskog ned mot elva.

#### **FAGLEG VURDERING**

Sjøv om lokaliteten er liten, er almebestandet av dei største "reine" på ytre Nordmøre. Sparsomt innslag av varmekjære artar i feltsjiktet. Interessante artar; trollbær, myske, kratthumleblom, junkerbregne, skogsvinerot, ormtelg, krattmjølke, skogvikke, hengeaks, lundrapp, tyrihjelm, sløkje, mjødurt, hundekveke. Nedanfor lia ligg ein kraftig gråorskog på ei grusflata ned mot elva.

#### **FORMÅLET MED VERNEFORSLAGET**

Formålet med verneforslaget er å sikre ei lauvskogsli med ein god almebestand og tilhørende gråorskog.

#### **UTFØRTE INNGREP**

Ingen.

#### **KJENDE INTERESSEKONFLIKTER**

Ingen.

#### **AKTUELLE SKJØTSELSTILTAK/MERKNADER**

Ingen.

#### **KJELDER**

Korsmo 1975, Marker 1977



## **ANDRE EDELLAUVKOGSLOKALITETAR SOM ER UNDERSØKT**

I samband med verneplanarbeidet er meir enn 160 edellauvskogslokalitetar undersøkt og vurdert. Mange av desse har stor verneinteresse i lokal samanheng og bør så langt det er råd, sikrast mot inngrep gjennom kommuneplanlegginga, og i den einskilde grunneigars bruk av

### **Oversiktskart over dei registrerte forekomstane:**

områda. Kart med nærmere avgrensing av dei registrerte forekomstane finst hos Miljøvernnavdelinga, og det vert utgjeve ein eigen rapport med oversyn over desse områda. Dei fleste er og innteikna på naturvernkartet i Naturatlasserien som alt er sendt kommunane.

### **34 MOLDE Ramnfloget sør**

Kartref.: 1220 I LQ 978 595

Areal 90 daa

Vestvent li med varmekjær lauvskog. Alm og hassel dominerer, med innslag av hegg og svartor i nedre delen. Varmekjære artar; trollbær, svartereknapp, sanikel, skogsvinerot, ramslauk, myske, kratthumleblom, jordnøtt, kusymre, vivendel, vårmarihand, skogkarse. Kilde: Bugge og Jordal 1988

### **35 HAREID Nessetelva**

Kartref.: 1119 I LQ 435 146

Areal 25 daa

God svartorbestand på flatlendt mark langs utløpet til Nessetelva og strandlinja langs Snipsøyrvatnet.

Kilde: Folkestad 1976

### **36 HAREID Nedrelid**

Kartref.: 1119 I LQ 476 158

Areal 10 daa

Bekkedal med svartorskog like nord for Hjørungdalsvatnet. To kvernhus av kulturverninteresse.

Kilde: Folkestad

### **37 VOLDA Fannene**

Kartref.: 1119 II LP 451 801

Areal 160 daa

Forekomst av lind i austvendt lauvskogsli i nordenden av Bjørkedalsvatnet. På ein rygg mellom skredlaup står fleire klynger med lind, tilsaman omlag 20 stammer. Vegetasjonen er relativt fattig, med mest bjørk og lyngmark. Nokre parti med hassel er litt frodigare. I feltsjiktet er det m.a. myske, svartereknapp, hengeaks, krattmjølke, kranskonvall, krattlodnegras, krossved og breiflangre.

Kilde: Bugge og Jordal 1988

### **38 VOLDA Lid**

Kartref.: 1119 II LQ 423 014

Areal 82 daa

Svakt sørhellande skogsområde i gjengroing ovafor busettinga på Lid med svartor. Skogen er kransa av dyrka mark og område med skogsdrift. I tillegg til svartor er det mykje gråor og hassel i tresjiktet. Feltsjiktet er dominert av gråor-heggeskogsartar. Interessante artar; jordnøtt, heistarr og krattlodnegras. Lokaliteten er botanisk sett svært interessant som eit spesialområde for utvekling av svartorskog etter tidlegare intensiv bruk til slått og beite.

Kilde: Bugge og Jordal 1988

### **39 VOLDA Stigedal**

Kartref.: 1218 I LP 486 756

Areal 1150 daa

Almeli i VSV-vendt helling det meste av Stigedalen. Typisk V-dal. Særprega geologi, spesielt på austsida. (ura, raskjeglene m.v). Det er og noko almeskog på vestsida av dalen og vidare over grensa til Sogn og Fjordane. I tillegg er det ein større forekomst av lind på NØ-siden av dalen i S-vendt bratt ur ned mot Alflolevatnet. Varmekjære og andre artar; ormtelg, hengeaks, myske, stormesle, skogstjerneblom, kvitsoleie, krattmjølke, kvitveis, trollurt, firblad, tannrot, hegg, hundekveke, skogsvinerot, brunrot, blankstorkenebb, lundrapp, grov og vanleg nattfiol, trollbær, storklokke, kratthumleblom.

Kilde: Folkestad (pers.med.), Marker-77, Bugge og Jordal 1988

#### **40 VOLDA Nautvik**

Kartref.: 1119 II LP 422 927

Areal 25 daa

Gråor-askeskog med hassel og innslag av gråor, hegg og rips. Myske, sanikel, kratthumleblom, jordnøtt, vivendel, kusymre, lundrapp, krattmjølke i feltsjiktet.

Kilde: Bugge og Jordal 1988

#### **41 VOLDA Hondalsvatnet**

Kartref.: 1119 II LP 516 911

Areal 55 daa

Almeskog med relativt glissen tresetting. Arter: Trollbær, liljekonvall, myske, turt, firblad, kranskonvall, junkerbregne, taggbregne, brunrot, trollurt, kvitsoleie, skogburkne.

Kilde: Korsmo-75

#### **42 VOLDA Alida**

Kartref.: 1119 II LP 435 982

Areal 55 daa

Svartorskog oppblanda med alm mellom sjøen og vegen. Innslag av bjørk, selje og rogn og einer i busksjiktet. Dominans av bregner og bringebær i delar av lia. Varmekjære arter; krattmjølke, kratthumleblom, trollurt, myske, ormtelg, krattlodnegras og jordnøtt.

Kilde: Folkestad, Bugge og Jordal 1988

#### **43 VOLDA Urane**

Kartref.: 1219 III LP 597 863

Areal 320 daa

Sørvestvendt li innafor Aurstad med varmekjær lauvskogsvegetasjon. Rasutsett skredmark.

Kilde: JRI-88, Folkestad pers.med.

#### **44 VOLDA Ervikvatnet**

Kartref.: 1119 II LP 511 890

Areal 55 daa

Svartor langs utløpselva. Det er og eit betydeleg innslag av svartor i kulturlandskapet vestover.

Kilde: Folkestad-76.

#### **45 VOLDA Hunnes**

Kartref.: 1219 III LP 555 873

Areal 730 daa

Bratt sørsvendt fjordli med innslag av varmekjær vegetasjon. Det har vore hegrekoloni i området.

Kilde: Jordreg.inst.-87

#### **46 ØRSTA Linderemmen**

Kartref.: 1219 III LQ 714 031

Areal 290 daa

Lindeskog med innslag av hassel, osp og bjørk i tresjiktet, i bratt SV-vendt liside ned mot Hjørundfjorden. Gneis i berggrunnen. Bestandet med lind er på 2 da, og avgrensa av rasmark og bjørkeskog. Plantogeografisk er lokaliteten av stor interesse med ein av dei nordvestlegaste forekomstane av lind i Norge. Osp og hassel dominerer i lia, med eit konstant innslag av alm. Variert feltsjikt.

Kilde: Korsmo-75 Bugge og Folkestad 1988.

#### **47 ØRSTA Øye**

Kartref.: 1219 III LP 784 984

Areal 370 daa

Mindre lauvskogslokalitet i bratt sørvestli nord for Øye sentrum. Skogen har eit "uryddig" preg med mange lauvtreslag og eit svært frodig feltsjikt. Bjørk og hassel dominerer med ein del ask, platanlønn, alm, hegg og gråor.

Lokaliteten er utypisk og frodig, varmekjære artar; myske, kratthumleblom, tannrot, sanikel, ormtelg og lundrapp. Friske delar har markert gråorskogpreg med m.a. gauksyre, hundekveke, skogstjerneblom, vendelrot, krypsoleie, skogsvinerot, sløkje og mjødurt. Elles finst m.a. raudhyll, storfrytle, haremat, trollurt, åkerminneblom, kvitsoleie, skogsalat, breiflangre, brunrot, piggstarr og gulflatbelg.

Kjelder: Bugge og Jordal 1988

#### **48 ØRSTA Molaupen**

Kartref.: 1219 IV LQ 680 112

Areal 280 daa

Fleire store almetre i bratte berg ned mot sjøen. I elvegjelet i sør står det frodig lauvskog med bjørk, gråor, osp, rogn og ein del alm. Mykje hassel i busksjiktet.

Kilde: Bugge og Folkestad 1988.

#### **49 ØRSTA Stokkelia-Lyngneset**

Kartref.: 1219 IV LQ 687 090

Areal 800 daa

Vestvendt li med glissen bjørkeskog og alm i øvre delen. Nokre furutre på Barlindneset, der det og skal vere barlind.

Kilde: Bugge og Folkestad 1988.

#### **50 ØRSTA Rønningen**

Kartref.: 1219 III LQ 708 043

Areal 240 daa

Uvanleg frodig og homogen hasselskog i SV-vendt li. Ei og anna bjørk, hengebjørk og selje splittar opp kronetaket i hasselbestandet. Frå feltsjiktet er det notert myske, skogfredløs, hengeaks, og vivendel.

Kilde: Bugge og Folkestad 1988.

#### **51 ØRSTA Urke-Øye**

Kartref.: 1219 III LP 764 999

Areal 2470 daa

Sørvestli med mange skredfar og sva. I vestdelen er ei fin bestand gråor-almeskog, og det er mykje hassel og alm elles i lia. Fin bestand osp øvst i lia. Innover fjorden er skogen meir glissen og dominert av bjørk, med innslag av osp, hassel og noko alm. Veg og kraftline i nedkant av lia, og fleire mindre granplantefelt.

Kilde: Bugge og Folkestad 1988.

#### **52 ØRSTA Stålbergneset-Gallsteinane**

Kartref.: 1219 III LP 739 967

Areal 1780 daa

SV-vendt li med glissen lauvskog. To fine almebestand, ein i nord, og ein under Blåhornet. Frodig lauvskog i skredur med m.a. gråor. Elles finst bjørk, hassel osp og alm. Heilt i sør er eit mindre felt med planta gran.

Kilde: Bugge og Folkestad 1988.

### **53 ØRSTA Bjørke**

Kartref.: 1219 III LP 727 892

Areal 90 daa

SV-vendt bratt berghammar og steinur med ein liten almebestand.

Kilde: Bugge og Folkestad 1988

### **54 ØRSTA Hustadnes**

Kartref.: 1219 III LP 700 996

Areal 290 daa

Svært storvaksen almebestand i stupbratt, austvendt berghammar midt i Hjørundfjorden. Almetrea står heilt frå toppen av åsen og ned til fjorden der store tre har greinene hengande utover sjøen. I bestandet elles er det innslag av hassel, osp, bjørk og gråor. I nord grensar almeskogen mot beitemark.

Kilde: Bugge og Folkestad 1988.

### **55 ØRSKOG Li**

Kartref.: 1219 I LQ 871 306

Areal 40 daa

Platanlønnbestand i SØ-vendt li ved Sjøholt. Innslag av ask og hassel. Arter: Søtkirsebær, rips, stikkelsbær, fagerperikum, smørtelg, jordnøtt.

Kilde: Korsmo-77

### **56 ØRSKOG Vestre**

Kartref.: 1219 I LQ 905 270

Areal 35 daa

Gråor-askeskog (?) på grusøyr på sørsida av elveutløp. Steinstrand med strandrug ved sjøen. Eit naust.

Kilde: Bugge og Folkestad 1988.

### **57 ØRSKOG Lisetvik**

Kartref.: 1219 I LQ 874 277

Areal 30 daa

Frodig bjørkeli med ein del ask, platanlønn og osp. Stort innslag av hassel i busksjiktet.

Svartor i strandsona.

Kilde: Bugge og Folkestad 1988.

### **58 ØRSKOG Gausnes**

Kartref.: 1219 I LQ 867 276

Areal 35 daa

Svartorbestand, særleg i strandsona, men og med ein del tre bak strandberga.

Kilde: Bugge og Folkestad 1988.

### **59 YSTE FURNESET Norddal kommune**

Kartref.: 1319 IV MQ 156 065

Areal i dekar: 250

Frodig sørvendt lauvskogsli med bra almebestand i austenden. Hengebjørk med oppslag av hassel og alm i vestenden. Lokaliteteten ligg aust for tunellinnslaget til Tafjordtunellen.

Bra bestand varmekjær lauvskog i ei fjordli som elles er prega av rasmark utan tresetting.

Varmekjære arter; skogfaks, sanikel, myske, kratthumleblom, svarterteknapp, vårvartecknapp, fingerstarr, ormtelg, lundrapp, skogvikke. Andre interessante arter; smørbukk, skogmarihand, dvergmispel, tjørebliom, trollurt, begerhagtorn og sølvvasal.

Kjelder: Bugge og Jordal 1988

## **60 NORDDAL Alvika-Seineset**

Kartref.: 1319 IV MQ 160 041

Areal 840 daa

Nordaustvendt lauvskogsli i Tafjorden med alm-bjørkeskog i vekslande utforming. Særleg den nordvendte "hola" ved Seineset har frodig utforming med bra innslag av alm.

Kilde: Bugge og Folkestad 1988

## **61 NORDDAL Slufsa**

Kartref.: 1319 III MQ 172 023

Areal 335 daa

Svært frodig lauvskogsli på rasvifte med bjørk og gråor. I nordenden står ein relativt stor og homogen almebestand. Ned mot sjøen og i sørrenden er det planta noko gran.

Elva Slufsa stuper ned i eit mektig fossefall på 6-700 meter.

Kilde: Bugge og Folkestad 1988

## **62 NORDDAL Tafjord aust**

Kartref.: 1319 III MQ 184 014

Areal 450 daa

Rik og frodig alm-hassel-li, der skogen er oppsplitta av fjellknausar og grunnlendt mark. Li er vestekspontert. På grusvifte står det gråor og osp i eit frodig bestand. Det går veg og ei kraftline i nedkant av lia. Lia ligg innafor det foreslattede Tafjord landskapsvernområde. Artar; myske, kratthumleblom, skogsvingel, ormtelg, fingerstarr, krattmjølke, lundrapp, skogvikke, skogstjerneblom, tyrihjelm, storklokke, turt, firblad, skogsvinerot, lakrismjelt, smørbukk, lifiol, trollurt.

Kilde: Bugge og Jordal 1988

## **63 NORDDAL Tafjord vest**

Kartref.: 1319 III MQ 171 008

Areal 500 daa

Austvendt li ovafor busetnaden i Tafjord. Marka er grunnlendt, men har eit rikt, varmekjært preg, med flekkvise forekomstar av alm.

Kilde: Bugge og Folkestad 1988

## **64 NORDDAL Linge**

Kartref.: 1219 I MQ 071 075

Areal 105 daa

Liten lokalitet med rik vegetasjon. I stranda står svartor og morell. Oppfor riksvegen er det innslag av ask, og kraftig oppslag av hassel i kraftgata.

Det står fleire hytter i strandsona.

Kilde: Bugge og Folkestad 1988

## **65 NORDDAL Steiggelet**

Kartref.: 1219 I MQ 051 083

Areal 160 daa

Frodig, tett lauvskogsli med bjørk, osp, alm og hassel i SV-vendt fjellskråning ovafor riksvegen. Bestandet grensar mot glisen furuskog.

Kilde: Bugge og Folkestad 1988

## **66 NORDDAL Herdalen**

Kartref.: 1319 III MQ 118 003

Areal daa

Trang dal med innslag av edellauvskog med alm på gunstige lokalitetar. Liten almeli på skredmark ved Dampfossen med m.a. lodnebregne, lifiol, taggbregne, ormtelg, hengeaks, skogsvinerot, lundrapp, myske, kratthumleblom, tyrihjelm, hundekveke, kransmynte, krattmjølke, skogsvingel, trollurt, brudespore.

Kilde: Folkestad-76, Bugge og Jordal 1988

## **67 STRANDA Liastøa**

Kartref.: 1219 I LQ 991 104

Areal 50 daa

Lokalklimatisk gunstig strandområde med stor villmorellbestand. Kristtorn på grensa av si utbreiing. Flekkvis små bestand med grov alm og gråor. Det er bygd veg nedgjennom lia.

Kilde: Folkestad-76, Bugge og Folkestad 1988.

## **68 STRANDA Ljøen**

Kartref.: 1219 II LP 917 894

Areal 140 daa

Bratt fjordli med frodig lauvskog og kulturmark dels under attgroing. To svært store lindetre, hagtorn og eit markert innslag av alm.

Kilde: Folkestad-76, Bugge og Folkestad 1988.

## **69 STRANDA Tynnbjørgane**

Kartref.: 1219 II LP 941 935

Areal 315 daa

Almeskog i sør austvendt li midtveges i Sunnylvsfjorden. Skogen er oppdelt med skredløp og bekkefar. I tillegg til alm, er det m.a. innslag av hassel og gråor.

Lokalitetene er den yste av dei gode edellauvskogslokalitetane i Sunnylvsfjorden. Varmekjære artar; lundgrønaks, skogfaks, sanikel, svarteknapp, storklokke, skogvikke, samt hagtorn, (små)borre, kung, burot og sölvasal.

Lokalitetene ligg innafor foreslått landskapsvernområde.

Kjelder: Bugge og Folkestad 1988

## **70 STRANDA Åkerne**

Kartref.: 1219 II LP 955 950

Areal 1030 daa

Større fjordli med hassel og alm. Tydeleg kulturpreg etter m.a. beiting. Frodig gråorskog på grusvifte. På ein grusrygg mellom to skredløp høgt oppe i lia står ein frodig almebestand.

Kilde: Bugge og Folkestad 1988

## **71 STRANDA Jogardstranda**

Kartref.: 1219 II LP 919 877

Areal 250 daa

Tett slutta lauvskog med alm, osp, bjørk og gråor i ei nordvestvendt li. Nord-delen av lokalitetene er meir glissen.

Kilde: Bugge og Folkestad 1988

## **72 STRANDA Friaren-Skagen**

Kartref.: 1219 II MP 019 880

Areal 840 daa

Nordvest- og nordvendt bratt fjordli med alm som dominerande treslag. Ved Friaren dominerer bjørk og gråor, med eit godt innslag av alm. I lia nedanfor Geitflå er almeskogen tettslutta, og med store dimensjonar på trea. Innslag av hegg, gråor, hassel og rogn. Her er det og planta litt gran. Under Skagen går fjellhammaren stupbratt i fjorden, men overalt der det er muleg å klore seg fast, står det alm. Saman med almeliene på nordsida av fjorden utgjer denne delen av Geirangerfjorden eit svært verneverdig botanisk naturområde.

Kilde: Bugge og Folkestad 1988

**73 STRANDA Bringen-Sju Søstre**

Kartref.: 1219 II MP 012 888 Areal 1550 daa  
Skredutsett og bratt fjordli med hasselkratt, noko alm og hengebjørk. Sør for Sju Søstre står ein fint utvikla liten almebestand.  
Kilde: Bugge og Folkestad 1988

**74 STRANDA Furnesvika**

Kartref.: 1219 II LP 949 911 Areal 415 daa  
Frodig vestvendt fjordli med hengebjørk, alm og gråor.  
Kilde: Bugge og Folkestad 1988.

**75 STRANDA Oaldsbygda**

Kartref.: 1219 II LP 977 944 Areal 585 daa  
Frodige lauvskogslier ned mot fjorden. Gråor og bjørk dominerer, med innslag av alm og hassel. Vegetasjonen i sjølve Oaldsbygda er kartlagd i ei studentoppgåve.  
Kilde: Bugge og Folkestad 1988.

**76 STRANDA Ovrå**

Kartref.: 1219 I MQ 008 096 Areal 90 daa  
Bratt SV-vendt edellauvskogsli mellom fjorden og dyrka mark på eit platå 140 moh. I austenden står det uvanleg frodig almeskog i tett bestand. Elles er det rik blandingslauvskog med alm, hengebjørk, hassel, morell, svartor, rogn, platanlønn, hegg, (dverg)mispel og furu. Nede ved stranda står 3-4 tørre almetre. Eit nedløpsrør går ned gjennom lia og ut i fjorden.  
Kilde: Bugge og Folkestad 1988.

**77 STORDAL Bjørkeneset**

Kartref.: 1219 I LQ 927 247 Areal 390 daa  
Almeskog med innslag av gråor-heggeskog i SSV-vendt liside med gneis i berggrunnen. Innslag også av osp i tresjiktet. Korsmo's lokalitet ligg i nord, og er noko redusert gjennom vegbygging. Resten av lia er med samanhengande almeskog, noko oppdelt av granplantefelt. I stranda står det svartor og vivendel. Interessante artar; myske, lundgrønaks, svarterteknapp, krathumleblom, sanikel, kjempesvingel, skogfaks, ramslauk, trollbær, fingerstarr, kusymre, vårmarihand, jordnøtt, lundrapp, breiflangre, småborre, krattmjølke.  
Kilde: Korsmo-75, Bugge og Folkestad 1988 Bugge og Jordal 1987-88

**78 STORDAL Vidhammar-Skjortneset**

Kartref.: 1219 I LQ 907 188 Areal 480 daa  
Større austvendt fjordli med hassel og gråor som dominerande treslag. Innslag av hengebjørk og alm. Beiting av geit har sett preg på vegetasjonen.  
Kilde: Bugge og Folkestad 1988

**79 STORDAL Holmebugen**

Kartref.: 1219 I LQ 948 177 Areal 855 daa  
Frodig nordvendt lauvskogsli på sørsida av Stordalsvika. Bjørk, osp og gråor dominerer. På ei skredrenne midt i lia står ein svært frodig bestand med gråor-platanlønnskog. Ask og platanlønn kjem inn i austenden. I tillegg er det planta ein del gran i denne delen av lia.  
Kilde: Bugge og Folkestad 1988

**80 STORDAL Seljeneset**

Kartref.: 1219 I LQ 944 196

Areal 775 daa

Vestvendt fjordli med dominans av osp. Markert innslag av furu-/hengebjørkeskog. Stort oppslag av hassel i busksjiktet.

Kilde: Bugge og Folkestad 1988

**81 STORDAL Stamnes**

Kartref.: 1219 I LQ 941 205

Areal 245 daa

Tett, frodig lauvskogsli der gråor dominerer i nedre delen, og hengebjørk i øvre delen. God forekomst av ask, osp og hassel, innslag av alm. Artar; lundgrønaks, myske, sanikel, vårmarihand, lundrapp, krattmjølke, breiflangre, vill-lauk, krossved.

Kilde: Bugge og Folkestad 1988, Bugge og Jordal 1988

**82 STORDAL Under Stamnesbotn**

Kartref.: 1219 I LQ 943 216

Areal 205 daa

Vestvendt lauvskogsli, lik lokaliteten Stamnes, men med større innslag av alm. Artar; ask, sanikel, lundgrønaks, myske, krattmjølke, grov nattfiol, trollurt, breiflangre, brudespore.

Kilde: Bugge og Folkestad 1988, Bugge og Jordal 1988

**83 STORDAL Smineset**

Kartref.: 1219 I LQ 936 239

Areal 420 daa

Sørvestvendt fjordli med fleire mindre, men godt utvikla edellauvskogsbestand. Hassel og alm dominerer, med ein del osp og hengebjørk. Gråor i strandsona. Den best utvikla einskildbestanden står i nordenden av lia. Artar; svartereknapp, myske, lundgrønaks, kratthumleblom, sanikel, lundrapp, gulflatbelg, grov nattfiol.

Kilde: Bugge og Folkestad 1988, Bugge og Jordal 1988

**84 SYKKYLVEN Søvik**

Kartref.: 1219 I LQ 835 254

Areal 260 daa

Austvendt lauvskogsli med bjørk som dominerande i tresjiktet. Hassel dominerer busksjiktet. Ein del hegg og gråor, og innslag av alm og platanlønn. Kjerreveg går gjennom lia i nedkant, og ei kraftline krysser lia litt høgare oppe.

Kilde: Bugge og Folkestad 1988

**85 GISKE Kannset**

Kartref.: 1119 I LQ 425 300

Areal 50 daa

Rike hasselkratt på sørsida av Godøya.

Kilde: Marker-77

**86 HARAM Grovagjølet**

Kartref.: 1220 III LQ 616 366

Areal 195 daa

Lågurt-eikeskog med hassel på meget grunt jordsmonn.

Kilde: Korsmo-77

**87 HARAM Haramsøya sør**

Kartref.: 1120 II LQ 566 507

Areal daa

Rike hasselkratt i sørhellinger langs heile øya.

Kilde: Rønningen og Folkestad pers.med.

## 88 RAUMA Sogge Bru

Kartref.: 1320 II MQ 356 344

Areal 10 daa

Gråor-askeskog med sterk overvekt av ask i tresjiktet mellom jernbanen og E69, gneis i berggrunnen. Godt utvikla busksjikt med endel ask og hegg og noko platanlønn og rips. Svært frodig og krevjande feltsjikt. I Ø står endel råteinfisert gråor. Bestandet avgrensa i Ø av høgspentlinje. Gråor-askeskog er eit svært sjeldant vegetasjonssamfunn i Møre og Romsdal.

Kilde: Korsmo-75

## 89 RAUMA Marstein

Kartref.: 1319 I MQ 405 249

Areal 535 daa

Vestvendt almeli ved Marstein i Romsdalen. Lokaliteten grenser til fjellknauser og krattskog, og i nedkant mot dyrka mark. Denne lokaliteten er den best utvikla almeskogen i Romsdalen, og har slik høg verneverdi som typeområde for gråor-almeskog i Romsdalen. Relativt svakt artsutval i feltsjiktet, gjer likevel at lokaliteten ikkje er foreslått verna som naturreservat i verneplanen. Varmekjære artar; myske, firblad, storklokke, gullstjerne, vårerteknapp, krattfiol, fingerstarr, ormtelg, krattmjølke. Gråorskogsartar; skogburkne, lerkespore, gauksyre, skogsvinerot, skogstjerneblom, stornesle.

Kjelder: Holten 1984

## 90 RAUMA Selen

Kartref.: 1319 I MQ 399 256

Areal 490 daa

Elvekantbiotop med svartorskog, kulturmark i gjengroing og rikmyr like sør for Selen ved Marstein i Romsdalen. Svært vakkert kulturlandskap omkring. Mellom garden Selen og Rauma elv er det parti med tidlegare kulturmark som gror igjen med lauvskog og kratt. Frå rikmyra lenger sør renn ein liten bekk, der det står svartor langs med. Svartorskogen langs bekken har et trivielt feltsjikt, lyngtuer dominerer, og det er innslag av bjørk. Myra som bekken drenerer er en liten bakkemyr med rike sig. M.a. vart breiull og engstarr registrert. Ved bekkens utløp til Rauma er lauvskogen svært frodig, med gråor, hegg og hassel som dominerande treslag. Innslag av ask og bjørk, og mykje trollhegg og krossved i busksjiktet. Feltsjiktet er fordig, med gråor-heggeskogskarakter; sumphaukskjegg, mjødurt, sløkje, krathumleblom, gauksyre, skogburkne, firblad, kvitveis, skogstjerneblom, engsnelle, elvesnelle, myrhatt, bukkeblad, trollurt, hengeaks, myrmaure, krypsoleie, ormtelg, myske, mannasøtgras, og bekkeblom. Lokaliteten ligg innafor forslaget til Romsdalen landskapsvernombord, der eit av hovudverneformåla er å sikre kantvegetasjonen langs Rauma. Dersom landskapsvernombordet vert oppretta, kan ein sikre denne lokaliteten i nødvendig grad gjennom skjøtselsplanen.

Kjelder: Holten 1984, Stølen 1986, Bugge 1989

## 91 RAUMA Hestebakken

Kartref.: 1320 III MQ 333 370

Areal 240 daa

Gråor-askeskog med ei stripe av gråor-heggeskog langs Rauma. Gråor dominerer tresjiktet men med mykje ask. Hegg dominerer busksjiktet, og kjem opp i tresjiktet i SV. Lokaliteten ligg på kanten av ein grusterrasse mot Rauma og grensar elles mot E69 og beitemark. Feltsjiktet er frodig og variert. Etter Korsmo's registrering har lokaliteten vorte kraftig redusert pga. vegbygging. Det er kraftig reetablering av ask i vegkanten.

Kilde: Korsmo-75

## **92 RAUMA Styggefonngrova**

Kartref.: 1319 I MQ 486 213

Areal 215 daa

Gråor-heggeskog med innslag av alm. Beitepåverka. Arter: Tyrihjelm, myske.

Kilde: Korsmo-75

## **93 RAUMA Sør for Knutsætra**

Kartref.: 1319 IV MQ 315 277

Areal 30 daa

Almeskog med hassel og gråor. Arter: Tyrihjelm, trollbær, storklokke, trollurt, myske.

Kilde: Korsmo-75

## **94 RAUMA Åk**

Kartref.: 1320 II MQ 347 350

Areal 30 daa

Gråor-askeskog med innslag av platanlønn og hassel, og en mindre bestand med almeskog med hassel. Arter: Trollurt, firblad, jordnøtt.

Kilde: Korsmo-75

## **95 RAUMA Bjørmosen**

Kartref.: 1320 III MQ 335 371

Areal 120 daa

Gråor-Heggeskog og Gråor-Askeskog med sterkt oppblanding av platanlønn, bjørk og osp. Svak helling mot sør, med gneis i bergrunnen. Bestanden grensar mot fjell i N, mot bekke/furuskog i Ø, mot kraftlinje i S og mot bustadhus og veg i N. Hassel opptrer i eit glissett undertresjikt i heile bestanden. Feltsjiktet er frodig i dei friske delane. På tørrare substrat dominar grasbunden vegetasjon.

Kilde: Korsmo-75

## **96 RAUMA Horgheim**

Kartref.: 1319 I MQ 388 269

Areal 75 daa

Svartorskog ved evje sør for Horgheim. Lokaliteten er ein av dei to viktigaste svartor-lokalitetane i Romsdalen, lokaliteten ved Selen. Interessante artar; soleihov, myrmaure, trollhegg, myrhatt, bukkeblad, krossved, firblad, sløke, kvitveis, skogburkne og gauksyre. Lokaliteten har og ein viss verdi som raste- og hekkeplass for fugl. Området er ein viktig del av det vakre og produktive elvelandskapet mellom Remmem og Horgheimseidet, samt at denne delen av Romsdalen er foreslått innlemma i Romsdalen landskapsvernområde.

Kilde: Holten 1984, Stølen 1986

## **97 NESSET Mardalsbotnen**

Kartref.: 1319 I MQ 547 286

Areal 140 daa

To lokalitetar med almeskog og gråor-heggeskog i sig på 8 + 10 dekar. Grensar til vassdrag i S, og elles til ur og bjørkekratt. Variert og noko beitepåverka feltsjikt. Ingen av almetrea har vore styva. Det er påfallande å finne ein varmekjær lokalitet så tett opp til alpine veksttilhøve som her.

Kilde: Korsmo-75

## **98 NESSET Ytre Bjørk**

Kartref.: 1320 II MQ 574 328

Areal 90 daa

Almeskog med innslag av hassel på V-hellande grusvifte. Gneis berggrunn. Bestanden grensar mot Eikesdalsvatnet, mot bekke i N og Ø, og mot lauvskog i S. Frodig feltsjikt.

Almetrea er styva.

Kilde: Korsmo-75

**99 NESSET Nord for Katthammaren**

Kartref.: 1319 I MQ 575 303

Areal 200 daa

Almeskog og gråor-heggeskog på VNV-vendt grusvifte mot Eikesdalsvatnet kransa av ur og bjørkeskog. Gneis i berggrunnen. Innslag av rogn, bjørk og hassel. Svært frodig feltsjikt. Kraftig styving av almetrea, svak beiting.

Kilde: Korsmo-75

**100 NESSET Finnset 2**

Kartref.: 1419 IV MQ 637 233

Areal 430 daa

To adskilte bestand med almeskog på 100 dekar kvar. Store innslag av hassel. På SV-vendt rasmark kransa av blokkmark og krattskog av bjørk og hassel. Gneis i berggrunnen. I mellom eit mindre almebestand på 5 dekar med innslag av hassel.

Kilde: Korsmo-75

**101 NESSET Mardalen**

Kartref.: 1319 I MQ 556 295

Areal 290 daa

Almeskog i Ø-vendt li med innslag av hassel og gråor. Grenser mot beitemark i Ø, ellers mot lauvskog. Gneis berggrunn. Svært frodig og instruktivt feltsjikt. Sauebeiting. I tillegg eit mindre almebestand med gråor-heggeskog i sør med storbregneutforming.

Kilde: Korsmo-75

**102 NESSET Øvre Bjørk**

Kartref.: 1320 II MQ 574 316

Areal 170 daa

Almeskog.

Kilde: Marker-77

**103 NESSET Røldia**

Kartref.: 1320 I MQ 455 609

Areal 1120 daa

Sørvendte og bratte lier ovenfor Rød med mosaikk av fleire rike edellauvskogssamfunn. Nederst, i den slakke lia, har ein til dels massive og lågorrike hasselkratt. I bratte partier dominerer hassel saman med alm, bjørk og gråor med m.a. kravfulle artar som skogfaks, lundgrønak, skogsvingel, ramsløk og sanikel. Eit svartorbestand i nedkanten, med nokre mektige tre. Kraftgate og skogsveg har redusert skogsarealet vesentleg.

Kilde: Holten-79

**104 NESSET Eikesdal**

Kartref.: 1319 I MQ 587 272

Areal 2220 daa

Stor hasselskog i SV-vendt li, omlag 4 km i lengderetninga.

Kilde: Marker-77

**105 NESSET Finnset 1**

Kartref.: 1419 IV MQ 648 223

Areal 15 daa

Almeskog med innslag av hassel. Arter: Krossved, tyrihjelm, trollurt, myske, svartereknapp, kung, sanikel.

Kilde: Korsmo-75

### **106 NESSET Sør for Hoemssætra**

Kartref.: 1320 II MQ 564 357

Areal 110 daa

Bratt østvendt li med bjørk som dominerende treslag, men mange andre treslag er representert, m.a. alm og hassel. Største almetrærne finnes ved et engparti. Alma har tidlegare vore pila. Beite- og sterkt tråkkpåvirka.

Kilde: Bugge 1988

### **107 MIDSUND Orset**

Kartref.: 1220 II LQ 887 531

Areal 225 daa

Sørvendt lauvskogsli på sørsida av Otterøya. Variert skogs bilde med hasselkratt, gråorskog og innslag av svartorskog. Rik lauvskogsli med stor botanisk interesse. Floraen har tydeleg kystpreg, med karakterartar som vivendel, kusymre, jordnøtt og skogfredlaus. Andre varmekjære artar; svarteknapp, lundgrønak, myske, sanikel, ormtelg, krattmjølke og lundrapp. Svartknoppurt er og registrert i denne lokaliteten på Otterøya, elles kan nemnast breiflangre, stortveblad og trollurt. Denne lokaliteten vert ikkje foreslått verna, da lokaliteten lenger aust, Hagset-Opstad har høgare verneverdi. likevel er floraen så rik at lokaliteten bør sikrast gjennom kommuneplanlegginga.

Kjelder: Jordal 1988

### **108 MIDSUND Høgreset**

Kartref.: 1220 II LQ 923 541

Areal

Sørvendt lauvskogsli mellom Nord-Heggdal og Hagset på Otterøya. Variert skog, noko flatt i nedkant, og brattare bakover. Hassel og alm dominerer i dei varmaste delane, medan det er eit stort innslag av andre lauvtre. Ein del gran er og planta i området. Botanisk interessant lokalitet, med ei rad varmekjære artar; myske, skogfredlaus, sanikel, lundgrønak, krathumleblom, ramslauk, ormtelg, vivendel, kusymre, jordnøtt, krattmjølke, lundrapp og svartknoppurt. Lokaliteten har og innslag av svartor, samt grov nattfiol og hanekam.

Kjelder: Bugge og Jordal 1988.

### **109 MIDSUND Klauset**

Kartref.: 1220 II LQ 847 521

Areal 190 daa

Hasselkratt i sørvendt li.

Kilde: Bugge og Jordal 1988

### **110 MIDSUND Vågsdalen**

Kartref.: 1220 II LQ 861 563

Areal - daa

Varmekjær, kystprega lauvskog i sørvendt li ytst i Vågsdalen. Alm, hassel og gråor i tresjiktet. Interessante artar; myske, sanikel, trollbær, junkerbregne, skogfredlaus, lundgrønak, jordnøtt, kusymre, lundrapp, krossved, trollurt, brunrot, breiflangre.

Kjelder: Bugge og Jordal 1988

### **111 MIDSUND Trelvika**

Kartref.: 1220 III LQ 813 527

Areal 160 daa

Hasselkratt i vestvendt skredmark med noko alm. Interessante artar; lundgrønak, myske, sanikel, ramslauk, fingerstarr, jordnøtt, kusymre, vårmarihand, lundrapp, svartknoppurt, breiflangre, brudespore.

Kilde: Bugge og Jordal 1988

**112 AUKRA Eidskrem/Midtvoll**

Kartref.: 1220 I LQ 981 604

Areal 380 daa

Bratt vestvendt li med varmekjær vegetasjon. Alm eller svartor utgjer markerte innslag i tresjiktet. Rikt feltsjikt med kusymre som karakteristisk art i våraspektet. Truleg eit svært viktig område for krevjande småfuglartar.

Kilde: Folkestad pers.med.

**113 FRÆNA Reitvika**

Kartref.: 1220 I MQ 074 668

Areal 15 daa

Sørvestvendt strandskog med svartor på nordsida av Malmefjorden. Elles gråor, hegg og osp, og med m.a. kvitveis, ormtelg, jordnøtt, gauksyre, kvitveis, krattlodnegras og filtkongslys i feltsjiktet.

Kilde: Bugge og Jordal 1988

**114 FRÆNA Blokkehaugen**

Kartref.: 1220 I MQ 087 663

Areal 70 daa

Sørvendt lauvskogsholt med stort innslag av svartor. Spredde tre av rogn, bjørk, hegg. I feltsjiktet; kvitveis, mjødurt, skogburkne, engfiol, kusymre, markjordbær, gauksyre, firblad, skogkarse, stortveblad, vanleg nattfiol og jordnøtt. Rik småfuglfauna med m.a. gulsanger, tornsanger, munk, bjørkefink og gulspurv.

Kilde: Bugge og Jordal 1988

**115 FRÆNA Nerlandssetra**

Kartref.: 1220 I MQ 064 784

Areal 120 daa

Vestvendt lauvskogsli med urskogspreng og varmekjær flora. Lia ligg på austsida av Raudtuva. Alm dominerer flekkvis i lia. Av interessante artar kan nemnast vårkål, kvitveis, trollurt, sanikel, skogsvinerot, tannrot, myske, skogstjerneblom, ormtelg, lundrapp, kratthumleblom, firblad og kranskonvall.

Kilde: Bugge og Jordal 1988

**116 FRÆNA Jurtippen**

Kartref.: 1220 I MQ 077 836

Areal 70 daa

Vestvendt lauvskogsli med varmekjær vegetasjon under Stemhesten. Hassel dominerer, med innslag av bjørk, rogn, hegg og svartor. Varmekjære artar; sanikel, svarterteknapp, trollbær, storklokke, firblad, myske, kratthumleblom, kusymre og vårmarihand. Særleg interessante er funna av blankstorkenebb og kystmaigull.

Kilde: Bugge og Jordal 1988

**117 FRÆNA Skarsæt**

Kartref.: 1220 I MQ 025 754

Areal

Vestvendt lauvskogsli med dominans av bjørk, innslag av hassel og noko alm. Interessante artar; skogvikke, hengeaks, skogsvinerot, sanikel i dels store mengdar, myske, jordnøtt, tannrot, firblad, trollbær, skogstarr.

**118 FRÆNA Hostadvatnet naturreservat**

Kartref.: 1220 I MQ 082 809

Areal

Svartorskog rundt Hostadvatnet og langs utløpselva i nordenden. Verdas nordlegaste skogbestand av svartor. Takrørskogen i nordenden av vatnet er ein av fylkets største.

Kilde: Folkestad 1976

### **119 AVERØY Eikåsen**

Kartref.: 1321 III MQ 228 866

Areal 90 daa

Rik alm- og hasselskog i sørvestvendt bratt li ved Kårvåg. Lokaliteten er svært tilplanta med gran, slik at verneverdiane berre er fragment av det som var. Frå feltsjiktet kan nemnast skogstarr, skogfaks, ramslauk, sanikel, lundgrønaks, svartereknapp, vårerteknapp, myske, fingerstarr, kusymre, vårmarihand og krattlodnegras. Det aller meste av lia er i dag tilplanta med gran.

Kilde: Holten 1979

### **120 AVERØY Kvalshaug**

Kartref.: 1320 IV MQ 187 841

Areal 220 daa

Hasselkratt med kravfulle og sjeldne urter. Flora med indikatorar på dei rikaste og mest varmekjære edellauvskogane på Vestlandet. Den sørvendte lia ligg aust for Tøvik, på sørsida av Averøya. Bekkedalane har den frodigaste vegetasjonen med ramslauk, jordnøtt, skogstarr og lundgrønaks. Forekomsten av kystmaigull er verdas nordlegaste. I hasselkratta dominerer sanikel, myske, kusymre, fingerstarr og sølvbunke. Det er plantet en god del gran i lia, slik at verneverdien er vesentlig redusert.

Kilde: Holten-79

### **121 AVERØY Storhammaren**

Kartref.: 1320 IV MQ 270 823

Areal 35 daa

Hasselkratt, innslag av rik flora med m.a. kusymre, skogstarr og lundgrønaks. Lokaliteten ligg øvst i lia over Mork. Lauvskogen grenser mot granplantingar i nedkant.

Kilde: Holten-78

### **122 AVERØY Trollaldalen**

Kartref.: 1321 III MQ 309 889

Areal 140 daa

Blandingsskog furu/bjørk med innslag av alm og eindel hassel. Lokaliteten ligg avsides til i ei sørvendt li mellom Ristuva og Storklimpen. Området synes upåverka av hogst og husdyrbeite. Av floraen kan nemnast krattlodnegras, myske, skogburkne, skogfiol, junkerbregne, rasmslauk, kratthumleblom, skogsvingel, hengeaks, krattmjølke, brunrot, firblad, myskegras.

Kilde: Holten-78

### **123 AVERØY Hagahornet**

Kartref.: 1320 IV MQ 230 827

Areal 360 daa

Sørvendt li med rike hasselkratt med varmekjære urtar og gras. Kusymre, skogstarr, krossved, svartereknapp, sanikel, mørkkongslys, junkerbregne og jordnøtt. Krysning mellom kusymre og marinøkleblom, ein stor sjeldanheit, vart funnen nedst i lia. Over 300 moh. stort sett bjørk. Noko granplanting.

Kilde: Holten-79.

### **124 AVERØY Helset**

Kartref.: 1320 IV MQ 250 822

Areal 125 daa

Middels rike hasselkratt i sørvendt li på sørsida av Averøya. Stor bestand med junkerbregne og ramslauk på blokkmark under bergrota. Kransmynte, sanikel, skogstarr, fagerperikum, lundgrønaks, vårerteknapp og kusymre er andre interessante planteartar. Noko granplanting og husdyrbeite.



Kilde: Holten-78

### **132 GJEMNES Flemma**

Kartref.: 1320 I MQ 526 795

Areal 140 daa

Alm-/hasselkratt i søraustekspontert li ovafor Flemma. Frogig feltsjikt i nedre delar med lundgrønaks i tørre delar og høgstauder som kranskronvall og storklokke samt kvitsoleie, skogburkne og ormetelg på fuktig mark. Svartereknapp og vårtereknapp er vanlege varmekjære artar. Lokaliteten har få spor etter kulturpåverknad.

Kilde: Holten-78

### **133 TINGVOLL Kamlia (Herresdalen)**

Kartref.: 1321 II MQ 552 860

Areal 520 daa

Almeli i SV-helling. Litt fattigere enn Vulvik/Kansdal. Meget stor forekomst av den sjeldne blankstorkenebb. Skogstarr, tårnurt, sanikel, kransmynte, vårtereknapp, grov nattfiol, fingerstarr og krattlodnegras. Frogig bjørk/hasselskog. Spesielt interessant lokalitet pga stor høgde over havet (244-500m) og forekomsten av blankstorkenebb.

Kilde: Holten-79

### **134 TINGVOLL Hundane**

Kartref.: 1321 II MQ 542 922

Areal 580 daa

Hasselli med innslag av alm. Floristisk interessant vegetasjon med m.a. kusymre, jordnøtt, ramslauk, skogstarr og skogsvingel. Gneis i berggrunnen, rasmarkssubstrat.

Kilde: Holten-79

### **135 TINGVOLL Aspa**

Kartref.: 1321 II MQ 452 883

Areal 480 daa

Edellauvskogsområde med frisk alm/hassel/selje/rogn i austre del, og tørrere og varmere hasselkratt i vest. Interresante planteartar; revebjelle, fagerperikum, sanikel, myske, ramslauk, krattlodnegras, kransmynte, lundgrønaks, kusymre, svartereknapp, jordnøtt, krossved, mørk kongslys, markfrytle og svartknoppurt. Tørrbakkefloraen er sjeldent pent utvikla og skjøttes best ved at beitinga fortsetter.

Kilde: Holten-79

### **136 TINGVOLL Skjeveling/Haga**

Kartref.: 1320 I MQ 453 857

Areal 65 daa

Edellauvskogsområde med svartor, rikmyr og hassel. Spesiell flora med jordnøtt, ramslauk, kusymre, fagerperikum, sanikel. Gneis i berggrunnen, tynt morenedekke. Svartor/rikmyrsamfunnet utgjer omlag 15 daa. Lokaliteten ligg 15-75 moh. I samband med bygging av ny veg (KRIFAST) er store delar av lokaliteten sprengt bort.

Kilde: Holten-78

### **137 TINGVOLL Ulset**

Kartref.: 1321 II MQ 497 898

Areal 80 daa

Hasselkratt med interessant flora; vårtereknapp, skogfaks, krattlodnegras, myske, svartereknapp, krossved, sanikel, kransmynte samt sjeldne lav- og moseartar.

Kilde: Holten-79

**138 SUNNDAL Lykkja/Fagerhaugan**

Kartref.: 1420 III MQ 733 495

Areal 940 daa

Bratte rasmarker ved foten av Hovsnebb med varmekjær lauvskog. Rikt fugleliv og ikkje minst eit rikt insektliv med sjeldne artar.

Kilde: Folkestad-76.

**139 SUNNDAL Storløykja**

Kartref.: 1420 III MQ 846 474

Areal 150 daa

Svartor-sumpskog med innslag av gråor og bjørk i bekkedal. Feltsjiktet er trivielt. Lokaliteten ligg på mektige breelvavsetningar med gneis i berggrunnen. Dels kraftig kulturpåverknad gjennom beiting, trakk og vedhogst. Svartora regenererer raskt sålenge det høge grunnvassnivået vert halden intakt. Arter: Skogkarse, trollurt, myrhatt, sumphaukskjegg, springfrø, åkersnelle, skogmarihand, bukkeblad. I nyare tid er lokaliteten snauhogd i samband med bygging av ny veg, og svartora er mest borte.

Kilde: Holten-78, Korsmo-75, Jordal-88

**140 SUNNDAL Mæle**

Kartref.: 1420 III MQ 815 470

Areal

Svartorskog i eit band mellom fjellsida og dyrka mark under Haremsdalen i Sunndalen. I tillegg til svartor, står det mykje gråor, bjørk og hegg i lokaliteten. Interessante artar; trollurt, skogburkne, tyrihjelm, bringebær, kvitveis, skogsvinerot, skogstjerneblom, gauksyre, bekkeblom, grønnstarr, krossved og ryllsiv.

Kjelder: Jordal 1988

**141 SUNNDAL Gjørahaugen**

Kartref.: 1420 II NQ 051 364

Areal 4000 daa

Markert fjellknaus ved Gjøra i Sunndalen med stor artsrikdom og eit breitt utval vegetasjonstyper på eit avgrensa område. Sør- og sørvestvendte delar har rik edellauvskog med alm og hassel. Eit svært variert og artsrikt område. Her er det samla kystplanter, varmekjære sørlege og søraustlege artar, kontinentale (austlege) artar og fjellplanter på eit naturleg avgrensa lite område. Varmekjære artar; svarterteknapp, myske, vårmarihand. Andre interessante artar; mørk kongslys, filtkongslys, tjæreblom, engnellik, lakrismjelt, tysbast, blåmjelt, reinrose, norsk malurt. Området er foreslått verna i "barskogsplanen".

Kjelder: Holten 1978.

**142 SUNNDAL Litfahle**

Kartref.: 1420 II MQ 945 442

Areal 590 daa

Rik almeskog og lågurt bjørkeskog med hassel. Stor bestand av kantkonvall. Artsrikt feltsjikt i edellauvskogen.

Kilde: Holten-79

**143 SUNNDAL Sør for Dalavatnet**

Kartref.: 1420 III MQ 742 381

Areal 130 daa

Almebestand i SØ-vendt li i Litldalen. Arter: Tyrihjelm, trollbær, storklokke, trollurt, liljekonvall, myske, firblad, kantkonvall, strutseving, kvitsoleie.

Kilde: Korsmo-75

#### **144 SUNNDAL Dalavatnet**

Kartref.: 1420 II MQ 866 424

Areal 21 daa

Høgstaude-almeskog i sørvestnd skrånning med næringsrik jord. Forutan alm har tresjiktet hassel, bjørk. Tyrihjelm dominar flekkvis, elles trollbær, storklokke, myske, krathumleblom, strutseveng, brunrot, skogsvinerot, skogstjerneblom og hundekveke.

Kilde: Aune og Holten-80

#### **145 SUNNDAL Hoåsbrekka**

Kartref.: 1420 II MQ 873 468

Areal 900 daa

Sørvestnd rasmak med alm og hassel over eit forsumpa skogsområde og myr med svartor like nord for Hoåas i Sunndalen. Innslag av varmekjære og krevjande artar som; platanlønn, krossved, tyrihjelm, trollbær, storklokke, trollurt, myske, vårerteknapp, strutseveng, firblad, brunrot, skogvikke, bergrøyrkvein, piggstarr, sanikel og kjempesvingel. Området bør sikrast mot inngrep, da ein her på eit relativt lite område har stor variasjon av krevjande skogstypar. Særleg svartorbestandet er verdfullt.

#### **146 SURNADAL Sollia i Vindøldalen**

Kartref.: 1420 I MQ 975 835

Areal 2000 daa

Smal elvedal med edellauvskog opp til over 300 moh. Rike lauvskogslier med grov alm og frodig gråorskog. Innslag av hegg og hassel. Rikelig med junkerbregne og strutseveng i gråorskogen. Ekstremt rik og tett fuglefauna med sjeldne fugleartar, m.a. holeruggarar.

Kambrosilurbergartar i grunnen gir næringsrikt jordsmonn. Interessante artar; myske, storklokke, krathumleblom, ormtelg, krattmjølke, lundrapp, hengeaks, junkerbregne, skogstjerneblom, turt, skogsvinerot, tyrihjelm, hundekveke, stornesle, humle, kvitsoleie, trollurt, trollhegg.

Kilde: Marker-77, Folkestad-76, Jordal 1988

#### **147 SURNADAL Romålia**

Kartref.: 1420 I MQ 887 639

Areal 1850 daa

I den svært frodige lia dominerer alm og gråor tresjiktet, men med innslag av svært mange andre treslag. I fuktige delar står frodig høgstaudevegetasjon med storklokke, stornesle, mjødurt, tyrihjelm og turt, samt alle storbregnene som er registrert i Todalen. Elles finst kantkonvall, breiflangre, skogfaks, piggstarr, humle, krattslierekne, vanleg lerkespore, skogbjørnebær, svartertekapp, sanikel, brunrot og krossved. I den vestlege delen av området under Knyken dominar bjørk saman med alm tresjiktet.

Kilde: Liv Ellen Vold-81

#### **148 SURNADAL Lifoten av Knubban**

Kartref.: 1420 I MQ 950 613

Areal 250 daa

Alm utgjer saman med 6-7 andre treslag tresjiktet i denne bratte vestvende blokkmarka. Fuktig grunn. Av artsutvalet; storklokke, mjødurt, skogsvinerot, myske, junkerbregne, skogvikke, trollbær og myskegras.

Kilde: Liv Ellen Vold-81

**149 RINDAL Almberg**

Kartref.: 1421 II NQ 069 911

Areal 35 daa

Almeskog i elvejuv med dyrka mark på begge sider. Berggrunn av kambrosilurske sedimentbergartar. Innslag av gråor, hegg og hassel i tresjiktet. Frogig og artsrikt feltsjikt med m.a. trollbær, storklokke, kratthumleblom, firblad, skogsvinerot, krattfiol, fingerstarr, ormtelg, junkerbregne, lundrapp, skogkarse og eit stort utval gråor-heggeskogsartar.

Kilde: Korsmo-75

**150 RINDAL Rindal kirke**

Kartref.: 1421 II NQ 107 916

Areal daa

Lite holt med almeskog like ved Rindal kirke. Skogholtet dannar eit særmerkt naturmiljø med både plante- og dyresamfunn av meir kravfull karakter.

Kilde: Folkestad

**151 AURE Todalen**

Kartref.: 1421 II MR 889 109

Areal 1000 daa

Sørvestnord lauvskogsgli med gråor-almeskog, oppbroten av skrinne parti og skredmark under Hardfjellet. Fleire almebestand kransa av bjørk, og med hassel og hegg i busksjiktet. Mykje gråor særleg i nedre delen. Interessante arter; kjempesvingel, ramslauk, trollbær, firblad, myske, skogsvinerot, storklokke, lundgrønaks, slakkstarr, fingerstarr, ormtelg og junkerbregne.

Kilde: Korsmo 1975, Marker 1977

**152 AURE Gauplia**

Kartref.: 1421 I MR 900 250

Areal 1390 daa

Sørvestnord bratte lier langs Årvågsfjorden. Alm-hasselli med varmekjær flora.

Kilde: Marker-77 (A.Moen-72),

**153 AURE Aresvik**

Kartref.: 1421 III MR 707 041

Areal 42 daa

Alm-hasselskog med rik flora i ei smal stripe oppunder ein berghammar. Eksposisjonen er sør til austvendt.

Kilde: Marker-77, Folkestad-76

**154 AURE Skogset**

Kartref.: 1421 III MR 713 074

Areal 6 daa

To bestand av almeskog og gråor-heggeskog med innslag av hassel, hver på omlag 3 dekar. Arter: Tyrihjelm, trollbær, akelei, storklokke, trollurt, myske, turt, strutseveng, firblad, junkerbregne.

Kilde: Korsmo-75

**155 AURE Lindås**

Kartref.: 1421 III MR 784 081

Areal 1 daa

Tre store lindetre med hassel i busksjiktet. Ingen rekruttering av lind.

Kilde: Korsmo-75

**156 AURE Røyrneset/Bølia**

Kartref.: 1421 II MR 890 077

Areal 2000 daa

Stupbratt fjellside på nordsida av Vinjefjorden med varmekjær vegetasjon.

Kilde: Folkestad-76

**157 AURE Vik**

Kartref.: 1421 III MR 804 092

Areal 606 daa

Vest- og sør vendte bratte skogslier. Alm og hassel dominerer vegetasjonen.

Kilde: Folkestad-76

**158 HALSA Grytdalen**

Kartref.: 1421 III MQ 775 987

Areal 515 daa

Brattlendt lauvskogsli langs vestsida av dalen, med svært frodig vegetasjon, og med meir kravfulle og sjeldne plantesamfunn.

Kilde: Folkestad-76

**159 HALSA Skyhamran**

Kartref.: 1421 III MQ 813 976

Areal 195 daa

Bratt og rasutsett li med varmekjær vegetasjon. Tresjiktet er blanda med furu og hassel og med innslag av alm. Amfibolitt i berggrunnen. Tynt jordsmonn. Feltsjikt med sanikkeldominans, elles store gras, junkerbregne, fleire orkidear og kusymre.

Kilde: Hans H. Blom (pers.med. juni-87)

**160 HALSA Grasneset/Fjærli**

Kartref.: 1421 III MR 796 004

Areal 530 daa

Bratte sør vendte og lune rasmarker med frodig varmekjær vegetasjon. Or og hassel.

Kilde: Folkestad-76



## KVA INNEBER VERN?

### LOVHEIMEL

Vern av spesielle naturområde og naturforekomstar skjer i medhald av "Lov om naturvern" av 19. juni 1970, med seinare endringar. Det er i lova gitt heimel for oppretting av ulike vernekategoriar:

**Nasjonalparkar:** Store urørte, tilnærma urørte, egenarta eller vakre naturområde som i det vesentlege ligg på Statens grunn.

**Landskapsvernområde:** Egenarta eller vakre natur- eller kulturlandskap der tradisjonell verksemد (t.d. jord- og skogbruk) skal kunne halde fram til ein viss grad.

**Naturreservat:** Tilnærma urørte naturområde av særleg verdi eller område med spesiell naturtype som får etter måten strenge verneregler.

**Naturminne:** Geologiske, botaniske eller zoologiske forekomstar som fredast på grunn av høg vitskapelig eller historisk interesse eller har spesielle særpreg.

**Plante- eller dyrelivsfreding:** Artar eller samfunn av plantar og dyr som har særleg verdi som tilhaldstad for ei rekke artar.

For å verne edellauvskogsområde mot uønska inngrep, er det nødvendig med strenge verneregler. I samband med den komande verneplanen er det derfor aktuelt å bruke kategorien naturreservat.

I §8 i naturvernlova heiter det:

*Område som har urørt eller tilnærmet urørt natur eller utgjør spesiell naturtype og som har særskilt vitenskapelig eller pedagogisk betydning eller som skiller seg ut ved sin egenart, kan fredes som naturreservat. Et område kan totalfredes eller fredes for bestemte formål som skogreservat, myrreservat, fuglereservat eller lignende.*

For å sikre formålet med verneforsлага, må det utarbeidast verneregler. Det vil bli utarbeidd forslag til verneregler for kvar einskild lokalitet kor spesielle tilhøve og interesser som knyt seg til det einskilde område vert vurdert. I forslaget til verneregler er det derfor teke med eigne punkt under del V og VI der eventuelle særreglar for einskildområde kan takast inn. Dette gjeld t.d. reglar om hogst, motorferdsel, beiting o.l. i lokalitetar der dette ikkje vil redusere verneverdiane.

## FORSLAG TIL GENERELLE VERNEREGLAR

### FORSKRIFT OM VERN AV ..... NATURRESERVAT I ..... KOMMUNE, MØRE OG ROMSDAL FYLKE

#### I

I medhald av lov om naturvern av 19.juni 1979 nr. 63 med seinare endringar, §8, jf. §§ 10, 21, 22 og 23, er eit område i ..... kommune, Møre og Romsdal fylke, verna som naturreservat ved kgl. res. av ..... under nemninga "..... naturreservat".

#### II

Det freda området berører følgjande gnr./bnr.:

Naturreservatet dekkjer eit areal på ca .... dekar.

Grensene for naturreservatet går fram av vedlagte kart i målestokk 1:5000, dagsett Miljøverndepartementet ..... . Kartet og vernereglane blir oppbevarte i ..... kommune, hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

Dei nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkast i marka. Knekkpunkta bør koordinatfestast.

### III

Formålet med fredinga er å ta vare på ..... .

### IV

I det freda området gjeld følgjande føresegner, jf. punkta V - VIII:

1. Vegetasjon, også daude buskar og tre, er freda mot einkvar form for skade og øydelegging. Det er forbode å fjerne planter eller plantedelar frå reservatet. Nye planteartar må ikkje innførast. Treslagsskifte er ikkje tillate.
2. Dyre- og fuglelivet, inkludert reirplassar og hiområde, er freda mot skade og øydelegging med dei unntak som følger av pkt. V-VII.
3. Det må ikkje iverksetjast tiltak som kan endre dei naturgjevne tilhøva, som t.d. oppføring av bygningar, anlegg og faste innretningar, plassering av campingvogner, framføring av kloakkledninger, luftleidningar eller jordkablar, bygging av vegar, drenering eller anna form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, bålbranning, lagring eller dumping av avfall, tilføring av forureinande stoff, kjemiske middel eller gjødsel.

Opplistinga er ikkje uttømmande.

4. Motorisert ferdsel til lands er forbudt.

5. Militære øvingar, organisert idrettsutøving medrekna opplegg for orientering, trimløyper osb., riding, camping og telting er forbode.

### V

Føresegnene i punkt IV er ikkje til hinder for:

1. Gjennomføring av militær, operativ verksemد og tiltak i rednings-, ambulanse, politi-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltingsøyemed.
2. Vedlikehald av grøfteutløp som er tekne tidlegare og som drenerer tilgrensande jord- og skogbruksareal, etter at forvaltingsstyremaktene er varsla.

3. Sanking av hasselnøtter, bær og matsopp til eige bruk.
4. Tradisjonell beiting.
5. Jakt i medhald av viltlova.

**VI**

Forvaltningsstyresmakta, eller den forvaltningsstyresmakta fastset, kan gje løyve til:

1. Hogst av ved til eige bruk.

**VII**

Forvaltningsstyresmaktene, eller den forvaltningsstyresmaktene fastset, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredingsformålet. Det kan utarbeidast skjøtselsplan, som skal innehalde nærmere retningsliner for gjennomføringa av skjøtselstiltaka.

**VIII**

Forvaltningsstyresmaktene kan gjere unntak frå fredingsføresegnehene når formålet med fredinga krev det, samt for vitskaplege undersøkingar og arbeid av vesentleg samfunnsmessig verdi, og i spesielle tilfelle dersom det ikkje strir mot formålet med fredinga.

**IX**

Forvaltinga av fredingsføresegnehene er lagt til fylkesmannen i Møre og Romsdal.

**X**

Forskrifta trer i kraft straks.

## SAKSBEHANDLING OG FORVALTNING

Før eit vernetiltak kan gjennomførast blir det gjort eit omfattande førearbeid.

Saksbehandlinga for verneplan for edellauvskog i Møre og Romsdal er slik:

1. Naturfaglege registreringar og prioritering av verneverdiane. Kontakt med ulike fagstyresmakter og vit-skapelege institusjonar for å få innspill. Utarbeiding av rapporten "Verneverdig edellauvskog i Møre og Romsdal". Denne rapporten vart ferdig i 1991 og sendt til alle aktuelle grunneigarar og lokale styresmakter til orientering.
2. Kontakt med grunneigarar og andre interesserte partar, innhenting av informasjon. Gjennomført sommaren og hausten 1991.
3. Utarbeiding av utkast til verneplan, og oversending til Direktoratet for naturforvaltning for fagleg godkjening.
4. Det godkjente utkastet til verneplan (dette dokumentet) blir sendt alle berørte partar til høyring.
5. Verneforslaget blir slutthandsama av Direktpratet for naturforvaltning på bakgrunn av dei innkomne fråsegningene. Slutthandsaminga omfattar og ein høyingsrunde til ulike berørte departement, direktorat og organisjonar på nasjonalt plan.
6. Miljøverndepartementet legg verneplana fram for vedtak i regjeringa som kongeleg resolusjon.

Etter endelig vedtak om vern, vil alle grunneigarar umiddelbart få eit brev med melding om vedtaket, kart og verneregular, samt ei orientering om erstatningsreglane. Alle verneområde skal merkast opp i terrenget med grensemerker, og det skal etablerast oppsyn for vernområda.

### Økonomiske erstatning

I 1985 vedtok Stortinget nye reglar om erstatning ved oppretting av **reservat** (omfattar og biotopfreding etter naturvernlovas § 9) og **naturminne** (Ot.prp. nr 46 for 1983-84 og innst. O. nr 2 for 1984-85). Lovendringa vart sett i kraft frå 15.februar 1985. Grunneigarar og retshavarar i **slike område** vil ha krav på å få dekt dokumenterte økonomiske tap som ei følge av fredinga. Utmåling av erstatning skal skje i samsvar med lov av 6.april 1984 nr 17 "Om vederlag ved oreigning av fast eigedom (ekspropriasjons-erstatningslova)". Det økonomiske tapet skal fastsetjast på grunnlag av salsverdi eller bruksverdi. Men i begge tilfelle vil det berre kunne krevjast erstatning for slike former for økonomisk utnytting som blir forbodne etter vernereglane. I verneområde der grunneigaren kan halde fram med visse former for økonomisk utnytting, som t.d. beite eller hogst av ved til eige bruk, inneber eit slikt erstatningsprinsipp at grunneigaren får mindre i erstatning enn om området hadde vore selt eller ekspropriert.

Sjøl om vernereglane for eit reservat eller naturminne kan tilate ei viss næringssdrift, er vanlegvis større endringar i driftsforma forbode.

Det kan t.d. vere forbod mot intensiv skogsdrift i form av skogsvegar, grøfting, sprøyting og planting. Økonomiske tap som følge av eit slikt forbod kan krevjast erstatta dersom eislik meir intensiv drift må reknast som ei "pårekneleg utnytting som det røynleg er grunnlag for etter tilhøva på staden" (ekspropriasjonerstatningslovas §5). Også dette spørsmålet må vurdrast frå sak til sak. Når ein tek omsyn til påreknelege bruksendringar i samband med erstat-

ningsutmålinga, bestemmer imidlertid dei nye reglane i naturvernlovas § 20 tredje ledd at den verdi som heng saman med offentlege tilskot til bruksomlegging, ikkje skal erstattast.

Grunneigarar og rettshavarar i **land-skapsvernombordet** har ikkje krav på erstatning etter dei nye reglane. Det same gjeld ved **midlertidig vern**. Statens erstatningsplikt ved oppretting av **slike** verneområde er regulert i naturvernlovas § 20b som lyder:

Økonomisk tap som følge av vedtak etter §§ 3, 5 og 18 tredje ledd i denne lov kan i samsvar med alminnelige rettsgrunnsetninger kreves erstattet av staten. Med mindre annet er avtalt, avgjøres spørsmålet ved rettslig skjønn etter begjæring av en av partene innen ett år etter at vedtaket er kunngjort. Departementet kan forlenge fristen. Reglene i domstolsloven §§ 153-158 gjelder så langt de passer.

Med "alminnelige rettsgrunnsetninger" i denne samanheng sikter ein til dei retningslinene som har utvikla seg på grunnlag av prinsippet i GrL. 105, med sikte på lovgjeving som legg restriksjonar på utnytting av fast eide eiendom. Miljøverndepartementet vil peike på at det berre er i unntakstilfelle, der ein grunneigar eller rettshavar blir ramma hardt av vernevedtaket, at eit vedtak om oppretting av landskapsvern eller midlertidig vern kan utløyse krav om erstatning. Eigarar eller rettshavarar som meiner å ha krav på erstatning ved gjennomføring av slike vernesaker, må sjølv setje fram krav for

vedkomande domsstol innan eit år etter at det er gjeve melding om vernevedtaket.

Grunneigarar og rettshavarar i **reservat** eller **naturminne** må setje fram skriftlege krav til vedkomande fylkesmann innan eitt år etter at det er gjeve melding om vernevedtaket. Dette er **eit vilkår for rett til erstatning** etter desse reglane.

Miljøverndepartementet tek sikte på å løyse dei fleste erstatningssakene gjennom frivillige drøftingar. Departementet meiner at denne framgangsmåten vil vere like trygg for grunneigarane som eit rettsleg skjønn, og at den dessutan kan føre til eit raskare erstatningsoppgjer.

Dersom naturvernstyremaktene og dei berørte partane ikkje blir einige, må det offentlege sjøl setje fram krav om rettsleg skjønn for vedkomande domsstol. Skjønnsretten vil da fastsetje erstatninga. Staten må setje fram krav om rettsleg skjønn innan halvtanna år etter at det er gjeve melding om vernevedtaket om ikkje grunneigaren går med på utsetjing av fristen.

Ved rettsleg skjønn vil grunneigarar og rettshavarar få dekt sine utgifter til advokat etter reglane i skjønnslova. Også ved frivillige forhandlingar er miljøverndepartementet innstilt på å dekkje slike kostnader.

Ved melding om eit eventuelt fredingsvedtak vil det bli gjeve ei nærmare orientering om erstaningsreglane og om framgangsmåten ved fastsetjing av erstatningssummen.

## FORKLARING AV EIN DEL ORD OG UTTRYKK

**Bestand:** Tresett område med einsarta preg og med eit areal på minst 2 dekar.

**Biotop:** Nokonlunde einsarta område som er levestad for eit bestemt samfunn av dyr eller plantar.

**Bonitet:** Marka si evne til å produsere trevirke.

**Busksjikt:** Jf. feltsjikt.

**Edellauvskog:** Varmekjær lauvskog med lind, alm, hassel, lønn, eik, bøk, svartor eller ask, ofte på næringsrik grunn.

**Feltsjikt:** Den delen av vegetasjonsdekket som når opp til ca 1/2 meter. Feltsjiktet er samansett av urter, gras- og starrartar, småplanter av tre og busker. Busksjiktet er ca 1/2-3 meter, og tresjiktet over 3 meter.

**Klimakssamfunn:** Relativt stabil slutt-tilstand av eit plantesamfunn, t.d. eit skogsområde som endrar seg lite over lang tid.

**Lauving:** Lauving av lauvtre for å samle for til dyra om vinteren. I dag er lauvinga slutt dei fleste stader, men vi ser dei store lauvingstrea, oftaast alm, mange stader i fylket. Lauving har mange namn, som **piling og styving**.

**Oseanisk:** Tilhøve i naturen som skyldast nærleiken til havet, særleg klimatisk.

**Plantesamfunn:** Ei gruppe av planteartar med stort set same økologiske krav til miljøet som veks saman.

**Referanseområde:** Naturområde som i hovudsak er intakt (urørt), og som derfor kan nyttast til samanliknande studium av andre område som er utsette for inngrep (eller studier av andre intakte naturområde).

## LITTERATURLISTE

- Bugge, Odd-Arild, diverse upubliserte feltundersøkelser, Fylkesmannen i M&R 1988-92  
Folkestad, Alv Ottar, diverse upubliserte feltundersøkelser, Fylkesmannen i M&R 1970-90  
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, "Varmekjær lauvskog i Storfjorden og  
*Hjørundfjorden*", rapport 3-1988 (FM 88:3)  
Hagen, Erik, Rapport til Miljøverndepartementet, brev 11.10.1972  
Holten, Jarle Inge, "Helgeekskursjon til Stangvik" notat 1975  
Holten, Jarle Inge, "Verneverdige naturtyper på Nordmøre", DKNVS,Mus. 1978  
Holten, Jarle Inge, "Verneverdige naturtyper i Møre og Romsdal II", DKNVS,Mus. 1979  
Holten, Jarle Inge, "Rauma, 10-års verna vassdrag", DKNVS,Mus. Rapport 1984-4  
Hånde, Per Steinar, "En plantesosiologisk undersøkelse av lauvkogssamfunn i  
*Eikesdalsområdet med spesiell vekt på hasselskogen*", Univ. i Oslo 1969  
Jordal, John Bjarne, diverse upubliserte feltundersøkelser 1988-89  
Korsmo, Harald, "Naturvernrådets landsplan for edellauvskogsreservater i Norge IV,  
*Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal*", 1975  
Korsmo, Harald, "Forslag til reservater med barlind (*Taxus baccata*) L.", NLH, Ås 1976  
Korsmo, Harald, "Edellauvskogsinventeringer i Vest-Agder, Rogaland, Sogn og Fjordane  
og Møre og Romsdal", 1978  
Lid, Johannes, "Norsk, svensk og finsk flora", Det Norske Samlaget 1985  
Løfall, Bjørn Petter, diverse upubliserte feltundersøkelser, Fylkesmannen i M&R 1989  
Marker, E., "Landsplanen for verneverdige områder og forekomster",  
Miljøverndepartementet 1977  
Moen, Asbjørn, "Vegetasjonsregioner i Midt-Norge" Blyttia 1-2/88  
Nordisk Ministerråd, "Naturgeografisk regionindelning av Norden", NU B 1977:34  
Skogen, Arnfinn, Diverse upubliserte krysslister fra aktuelle lokaliteter 1963-86  
Stølen, Aud Målfrid, "En plantesosiologisk undersøkelse av svartorskog i Romsdalen,  
*Møre og Romsdal*", Bot. Inst. UNIT 1986  
Vold, L. E., "Flora og vegetasjon i Toåas nedbørsfelt, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag"  
Bot. undersøkelser i 10-års verna vassdrag  
Økoforsk, "Enheter for vegetasjonskartlegging i Norge", utredning 1987:1
- 

I tillegg har følgjande personar gjeve munnlege opplysningar:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| Bjørndalen, Jan Erik | Blom, Hans H. |
| Fremstad, Eli        | Holten, Jarle |
| Korsmo, Harald       | Moen, Asbjørn |
| Skogen, Arnfinn      |               |

